

Agriades glandon (Prunner, 1798) (= *orbitulus* Esper)

Superfamilia: *Lycaenoidea*

Familia: *Lycaenidae*

Subfamilia: *Polyommatinae*

Tribu: *Polyommatini*

Género: *Agriades* Hubner, 1819

Status: Endemismo a nivel subespecífico.

Planta nutricia: Primuláceas de los géneros *Gregoria*, *Androsace* y *Soldanella*, y en niveles inferiores de montaña sobre leguminosas del género *Astragalus*.

Distribución: Es una especie muy localizada, conocida en la Península Ibérica únicamente de los Pirineos leridano y oscense y de Sierra Nevada, tratándose de un taxón de alta montaña, que supera los 3.000 metros, sobre todo en la sierra granadina.

Hábitat: Vuela en áreas desprovistas de vegetación o con hierbas bajas diseminadas, y en el caso especial de Sierra Nevada coloniza laderas donde predominen

los estratos cristalinos, habiéndose separado de esta localidad la subespecie *zullichii* (= *nevadensis*), que algunos autores han elevado a categoría específica, mientras que las colonias pirenaicas catalano-aragonesas pertenecen a la subespecie *magnaglandon*, descrita de la vertiente francesa de los Pirineos centrales.

Ciclo biológico: Vuela en una sola generación entre julio y agosto, hibernando probablemente como larva y manteniendo durante su desarrollo una asociación simbiótica con hormigas.

Recomendaciones: Protección absoluta de la subespecie *zullichii*, de Sierra Nevada, cuyas colonias, por su localización y pequeña área, pueden desaparecer ante cualquier cambio del hábitat, estudiándose a la vez la biología del taxón para ver qué medidas complementarias son aconsejables.