

Coseinia romeii Sagarra 1924

Superfamilia: Noctuoidea

Familia: *Arctiidae*

Subfamilia: *Micrarctiinae*

Género: *Coseinia* Hubner, 1822

Status: Vulnerable.

Planta nutricia: Desconocida aunque es posible que se trate de *Lavandula spp.*, de las Labiadas, donde los adultos permanecen posados durante el día.

Distribución: Muy pocas colonias conocidas y muy separadas unas de otras, como son: La Vid (Burgos), Aranjuez, Montarco y Canillejas (Madrid), Sierra de Albarracín (Teruel) y Serranía de Cuenca (Cuenca), habiendo sido localizada recientemente en Montoñona y Bujaraloz (Zaragoza).

Hábitat: Areas pedregosas de coscojar y tomillar y parajes abiertos con rodales de espliego.

Ciclo biológico: Inverna como oruga, crisálida en el suelo y entra en actividad como imago al crepúsculo y durante el mes de septiembre, siendo atraída por la luz artificial, habiéndose descrito la f. *melanopterina*, caracterizada por tener casi negro el par de alas posteriores.

Recomendaciones: Este endemismo ha pasado de «raro» a «vulnerable», lo que indica que puede llegar a extinguirse en sus localizadas y débiles colonias conocidas. De llevarse a buen fin la Reserva Entomológica de El Regajal en Aranjuez (véase Viedma *et al.*, 1985), donde existe una colonia descubierta en la década de los sesenta, se habrá logrado momentáneamente proteger tanto el biotopo como la interesante fauna del mismo, entre la que destaca esta especie.