

*Erebia epistygne* (Hubner, 1819)

Superfamilia: *Nymphaloidea*

Familia: *Satyridae*

Subfamilia: *Satyrinae*

Tribu: *Erebiini*

Género: *Erebia* Dalman, 1816

**Status:** Rara.

**Planta nutricia:** Gramíneas como *Poa annua*, *P. pratensis*, *Festuca ovino*, *F. rubra*, etcétera.

**Distribución:** Muy localizada en áreas bien separadas unas de las otras, habiéndose descubierto en la divisoria N. E. de Madrid y N. O. de Guadalajara, ampliándose su área de distribución de Cuenca-Albarracín hasta Fredes/Castellón y manteniendo colonias de poca densidad en el Moncayo, el Pirineo leridano y el Montseny. Se han descrito las siguientes subespecies: *andera* (Serranía de Cuenca), *virithus* (Sierra de Albarracín), *fuliginosa* (el Moncayo), *ribasi* (el Montseny y zonas montañosas gerundenses circundantes) y *aemula* (de Pobla de Segur, Pirineo leridano). Su localidad típica son los Alpes franceses, no conociéndose de ningún otro lugar del mundo.

**Hábitat:** Zonas abiertas de vegetación pobre y base calcárea, prefiriendo biotopos montañosos entre los 1.000 y los 2.400 metros de altitud.

**Ciclo biológico:** Vuela en una corta generación que constituye, excepcionalmente, la más adelantada de su género, durante abril y mayo, permaneciendo en algunas áreas volando durante principios de junio. Inverna como oruga, pudiendo permanecer dos inviernos en este estado.

**Recomendaciones:** Debe protegerse al máximo este taxón, cuya biología en la Península Ibérica es casi desconocida, para después tomar las medidas que sean más aconsejables.