

*Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)

Superfamilia: *Papilionoidea*

Familia: *Papilionidae*

Subfamilia: *Parnassiinae*

Tribu: *Parnasiini*

Género: *Parnassius* Latreille, 1804

**Status:** Endemismos a nivel subespecie, algunas en estado de extinción.

**Planta nutricia:** Crasuláceas de los géneros *Sedum*, *Sempervivum* y *Bryophyllum*, siendo la plana más común a las diversas colonias ibéricas *Sedum telephium*.

**Distribución:** Mantiene colonias más o menos numerosas desde áreas montañosas de Lugo a lo largo de la Cordillera Cantábrico-Astur-Leonesa, incluidos los Pirineos en toda su extensión, penetrando en Palencia, Valladolid, Burgos hasta la Sierra de la Demanda y continuando por el Moncayo, los montes Universales, el Sistema Central y la Penibética, habiendo sido citada recientemente de la provincia de Castellón. Se han descrito como subespecies ibéricas las siguientes: *aizpuruae* (montañas de San Cristóbal, Alava), *antijesuista* (Pirineo de Gerona y alrededores), *aragonicus* (Sierra de la Peña, Huesca), *ardanazi* (Picos de Europa, Santander), *asturiensis* (Asturias, León), *escalerae* (Sierra de Guadarrama, vertientes norte y sur), *filabricus* (Sierra de Filabres, Almería), *gadorenensis* (Sierra de Gador, Almería), *germainae* (Sierra de Gúdar, Teruel), *hispanicus* (Sierra de Albarracín y Serranía de Cuenca), *lessei* (Sierra de Andía, Navarra), *laufferi* (El Moncayo, Zaragoza, Soria), *manleyi* (Sierra Mencililla-Demanda, Picos de Urbión, Burgos, Soria, Logroño), *mariae* (Sierra María, Almería), *marteni* (centro y nordeste de Burgos), *maurilianus* (norte de Palencia), *nevadensis* (Sierra Nevada, Granada), *nichollae* (Sierra de Javalambre, Teruel), *odriozolae* (Aitzgorri, Urbia, Guipúzcoa), *pozazalensis* (puerto de Pozazal, Santander) y *wyatti* (vertiente noroeste de Guadarrama, Avila).

**Hábitat:** En España vuela entre los 700 y los 3.000 metros de altitud, en áreas abiertas y laderas por las que asciende y desciende majestuosamente.

**Ciclo biológico:** Vuela en una sola generación, desde finales de julio hasta comienzos de agosto, según el sistema montañoso que colonice, inverna como larva y crisalidando a finales de mayo y principios de junio dentro de un rudimentario capullo que se oculta en el suelo.

**Recomendaciones:** Merece protección absoluta en todas sus colonias para evitar su desaparición, como ha ocurrido ya con las subespecies *pozazalensis*, *odriozolae*, *aizpuruae* y está a punto de suceder con *mariae*, *filabricus* y *nevadensis*, debiendo continuarse las investigaciones en la Sierra de Gredos, la Sierra Espuña y la Sierra de Alcaraz.