

*Pseudochazara hippolyte* (Esper, 1783)

Superfamilia: *Nymphaloidea*

Familia: *Satyridae*

Subfamilia: *Satyrinae*

Tribu: *Hipparchiini*

Género: *Pseudochazara* De Lesse, 1951

**Status:** Endemismo a nivel subespecífico.

**Planta nutricia:** Gramíneas herbáceas de montaña, sobre todo en áreas pedregosas e incluso sobre estrato cristalino.

**Distribución:** Conocida solamente de su localidad típica en los montes Urales, incluidas colonias que se extienden hasta las montañas del Tian Shan, y del Sureste español en algunas zonas de Sierra Nevada (Granada), Sierra de los Filabres y Sierra María (Almería) y Sierra de Espuña (Murcia).

**Ciclo biológico:** Vuela en una corta generación desde finales de julio a mediados de agosto, normalmente por encima de los 2.000 metros de altitud, aunque puede descender a cotas menores después de haber invernado como larva. Las colonias de Sierra Nevada y de los Filabres han sido diferenciadas como subespecie *williamsi* y las demás como subespecie *aislada*.

**Recomendaciones:** Estudiar su ciclo biológico y restringir su captura hasta que puedan estudiarse planes de conservación de mayor envergadura.