

Rhagades (Rhagades) predotae Naufock, 1930

Superfamilia: *Zygaenoidea*

Familia: *Zygaenidae*

Subfamilia: *Procridinae*

Tribu: *Procridini*

Género: *Rhagades* Wallengren, 1863

Subgénero: *Rhagades* Wallengren, 1863

Status: En peligro de extinción.

Planta nutricia: *Pyrus bourgeana*.

Distribución: Se ha ampliado el número de sus colonias, siempre escasas, de las originales conocidas de Sierra Alta, Noguera (Teruel) y Sotillo del Rincón (Soria) a otras en San Román de Cameros (Logroño), Huélamo, Tragacete y Uña (Cuenca) y más recientemente de Aracena (Huelva) y del monte Aitana (Alicante).

Hábitat: En las cercanías de arroyos y charcos, siempre en biotopos de gran humedad, por encima de los 400 m. y en donde existan *Pyrus* sp. y endrineros.

Ciclo biológico: Adultos en vuelo al amanecer y al anochecer del mes de julio, siempre posados durante el día sobre *Prunus spinosa*, el que se puede batir para que levanten el vuelo, hibernando como oruga.

Recomendaciones: Protección total de las reducidas y aisladas colonias que se conocen, reservándose por lo menos su biotopo de Noguera, donde se capturaron los ejemplares típicos, y el más reciente y meridional de la Sierra de Aracena (Huelva), donde su ciclo biológico y descripción de la desconocida hembra de la especie acaba de ser publicado (Vives Moreno & Huertas Dionisio, 1985).