

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

Castellano: Bigotudo

Catalán: Mallerenga de bigotis

Gallego: Rabilongo das canaveiras

Vasco: Tximutxa

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

CE: RARA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Pequeña población nidificante, sedentaria y dispersiva, muy localizada en Cataluña (1) (Delta del Ebro, Empordá), Comunidad Valenciana (2) (Albufera de Valencia, El Hondo, ocasionalmente en Santa Pola y río Mijares), Castilla-La Mancha (3) (zona de las Tablas de Daimiel, lagunas de Guadalajara) y Andalucía (4). En invierno está más repartido, llegando al menos hasta Aragón y Navarra. En Baleares existe una bita dudosa en Menorca (5); en Canarias no ha sido citado.

CE: Nidifica en varios países comunitarios, pero en localidades muy aisladas; falta completamente, como reproductor, en Portugal e Irlanda; tampoco cría en las grandes islas mediterráneas occidentales; sin embargo, parece estar en expansión.

MUNDO: Cría en zonas dispersas por el sur y el centro de Europa; además, en una amplia zona del suroeste y centro de Asia que abarca los grandes lagos asiáticos. Se reproduce también en China y Mongolia. Es sedentario, con movimientos dispersivos.

HABITAT

Zonas palustres, sobre todo grandes masas de carrizo y de espadañas, junto con masegares densos; casi siempre en áreas apartadas; en invierno también en humedales de menor tamaño. Algunas veces en arbolado, pero siempre en las proximidades de áreas palustres.

POBLACION

ESPAÑA: La población nidificante total no ha sido cuantificada, pero algunas estimaciones la sitúan en unos pocos miles de aves. En la Albufera de Valencia (2), no más de un centenar de parejas, y en El Hondo (1985), unas 70 parejas; en el Delta del Ebro (1) actualmente es nidificante común.

CE: En Portugal, sólo accidental. En Gran Bretaña, menos de 600 parejas (6). En Holanda (7), entre 700 y 1.400 parejas. Cifras también escasas en el resto de los países comunitarios.

MUNDO: Población mundial no evaluada.

AMENAZAS

La principal amenaza es la pérdida de hábitat, al ser una especie estrechamente ligada al carrizo. Esta pérdida puede ser natural, al pasar el carrizal a otro tipo de vegetación menos adecuada para la especie, o bien por desecación debida a la acción humana. También se ven muy afectados por los inviernos duros.

MEDIDAS DE CONSERVACION

La conservación de hábitat palustre (especialmente carrizales) es esencial, siendo además necesario que no sea de tamaño demasiado pequeño. Puede favorecerse la instalación de la especie por la creación de nuevos carrizales. En los inviernos muy crudos puede procurarse alimentación artificial.

REFERENCIAS

1. Muntaner, J.; Ferrer, X., y Martínez-Vilalta, A., eds. (1984): *Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra*. Ketres, Barcelona.
2. Urios, V.; Escobar, J. V.; Pardo, R., y Gómez, J. A., eds. (1991): *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Valencia.
3. Basanta-Reyes, L. F. (1986): *Fauna de Castilla-La Mancha. Aves 1*. Junta Castilla-La Mancha, Toledo.
4. ICONA (1986): *Lista Roja de los vertebrados de España*. MAPA, Madrid.
5. Muntaner, J., y Congost, J. (1979): "Avifauna de Menorca". *Treb. mus. Zool Barcelona, 1*: 1-173.
6. Batten, L. A.; Bibby, C. J.; Clement, P.; Elliot, G. D., y Porter, R. F., eds. (1990): *Red Data Birds in Britain*. Poyser, Londres.
7. Sovon, ed. (1987): *Atlas van de Nederlandse vogels*. SOVON, Arnhem.