

Bucanethes githagineus githagineus

M.H. C. Lichtenstein, 1823

Castellano: Camachuelo trompetero

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: RARA

CE: RARA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: La subespecie *B. g. githagineus* se encuentra en la provincia de Almería (sureste de la Península). En Canarias se encuentra la subespecie *B. g. amantum* (1).

CE: Sólo en España.

MUNDO: Se extiende por el norte de Africa (2, 3).

HABITAT

En Almería el área de nidificación del camachuelo trompetero está fragmentada en dos zonas. La más importante se extiende por la vertiente sur de la sierra de Alhamilla y el subdesierto de Tabernas, desde Níjar a Gerval, entre los 200 y 500 m de altitud. Una segunda zona abarca la mitad suroeste de la sierra del Cabo de Gata, en cotas de altitud algo inferiores. En ambas áreas se alternan terrenos montuosos con otros más llanos, surcados por barrancos y ramblas encajadas, con abundantes taludes y rocas de desplome gravitatorio. La cubierta vegetal, muy degradada, está formada por comunidades en las que predominan los caméfitos. Destacan las asociaciones vegetales dominadas por gramíneas (espartales y albardinales con *Stipa tenacissima* y *Ligeum spartum*), y por otra, las caracterizadas por tomillares-albardinales, integrados por *Thymus* sp. y *Anthyllis cytisoides* (4). Durante el período invernal la mayoría de los camachuelos se concentran en la costa, a escasos kilómetros de las áreas de cría, donde ocupan dunas y arenales costeros (con *Ammophila arenaria*, *Lotus creticus*, *Zyziphus lotus*, etc.) (4).

POBLACION

ESPAÑA: Desconocida. Teniendo en cuenta su pequeña área de distribución, el número debe de ser muy bajo. La tendencia parece ser a un lento incremento.

MUNDO. Desconocida; probablemente es muy abundante.

AMENAZAS

Esta subespecie no parece estar amenazada en su área de nidificación, buena parte de la cual está incluida en el Parque Natural de Cabo de Gata. En las áreas de invernada está amenazada por la caza con redes abatibles y los proyectos de urbanización. En menor escala inciden negativamente la presión turística y la transformación del hábitat para uso agrícola (1, 4).

MEDIDAS DE CONSERVACION

. Velar por el cumplimiento de la ley, que le protege estrictamente. Control del comercio de pájaros de jaula en la provincia de Almería (1, 4).

REFERENCIAS

1. ICONA(1986): Lista Roja de los Vertebrados de España. MAPA. Madrid.
2. Harrison ,C. (1982): *An atlas of the birds of the Western Palearctic* .Oxford University Press, Oxford.
3. Etchecopar, R. D. ,y Hue, F. (1964): *Les oiseaux du nord de l'Afrique* .Boubée ed. Paris.
4. Manrique, J., y Miralles, J. M. (1 988): "El camachuelo trompetero". *Quercus*, 32: 34-36.