

1. ENCUADRE TAXONÓMICO Y DENOMINACIONES

1.1. LA ESPECIE COMO TAXÓN

La **Cerceta Pardilla** (*Marmaronetta angustirostris* [Ménétries]) es una especie monotípica cuya taxonomía sigue aún siendo objeto de disputa. Constituye un eslabón evolutivo entre las Tribus *Anatini* ('Patos Nadadores') y *Aythyni* ('Patos Buceadores'), dentro de la *Subfamilia Anatinae* (Orden *Anseriformes*, Familia *Anatidae*).

La denominación original de Ménétries (*Anas angustirostris*) ha sido la más aceptada desde entonces, al considerarse esta especie una más del amplio género *Anas*. Sin embargo, JOHNSGARD (1961a) propuso la asignación de la Cerceta Pardilla a un género rmonotípico (*Marmaronetta*; Reichenbach, 1852), en base a sus particulares aspectos fisonómicos, anatómicos y etológicos. No obstante, su exacta ubicación dentro de la subfamilia varía según los autores; así, unos la sitúan al principio de la Tribu *Aythyni* (LIVEZEY, 1986; MADGE y BURN, 1988), mientras que otros la emplazan al final de la Tribu *Anatini* (CRAMP y SIMMONS, 1977; DEL HOYO *et al.*, 1992), y es que de hecho presenta rasgos comunes con ambos grupos.

Con los 'Patos Nadadores' tiene en común: plumaje del cuerpo, lobulación del dedo posterior, forma de alimentarse, voz y cortejos sexuales; mientras que se parece a los 'Patos Buceadores' en: diseño alar, movimientos de pre-vuelo, conducta pre y postcopulatoria y tubo traqueal del macho; como rasgos intermedios se citan el plumaje de los pollos y la estructura de la *bulla* traqueal. El hecho de que individuos en cautividad hayan hibridado con Porrones Pardos *Aythya nyroca*, y nunca con especies del género *Anas*, indicaría una mayor proximidad taxonómica a los porrones que a los ánades (JOHNSGARD, 1961a⁴).

1.2. DENOMINACIONES Y VERNÁCULOS

La nominación original de la Cerceta Pardilla como *Anos angustirostris* (literalmente, ánade de pico fino) fue realizada por Ménétries en 1832; el holotipo procede de Lenkoran, ciudad de Azerbaiyán situada en la ribera suroccidental del Mar Caspio.

La especie llegó a recibir otras diez denominaciones durante el pasado siglo, correspondientes a sendos autores (PHILLIPS, 1923): *Anos marmorata* (Gould, 1836), *Dafila marmorata* (Eyton, 1838), *Querquedula angustirostris* (Bonaparte, 1838), *Marmaronetta angustirostris* (Reichenbach, 1852), *Anas cypria* (Unger y Kotschy, 1865), *Marmonetta angustirostris* (von Martens, 1868), *Chaulelasmus angustirostris* (Gray, 1871), *Querquedula marmorata* (Dresser, 1872), *Chauliodes angustirostris* (Radde, 1884) y *Marmaronetta marmorata* (Blasius, 1894).

El vernáculo *pardilla* procede de las Marismas del Guadalquivir (Doñana, Villamanrique, Las Nuevas, Sanlúcar, etc.), habiendo sido recogido también por Irby, Chapman y Buck, y Pons (éste como *pardillo*); se fundamenta en el color pardo claro llamativo del plumaje (CARRO y BERNIS, 1972). Además de estas dos, GARRIDO (1994) recoge otra derivación del mismo origen, *pardilona*, procedente de Las Nuevas.

El vernáculo valenciano *rosseta* es muy antiguo, continuando en vigor actualmente. Ya ESCOLANO (1611) menciona las *rosas* y *rosetas*, aunque no está del todo claro que se refiera en ambos casos a la Cerceta Pardilla, lo que no ocurre con ORELLANA (1795), que como *roseta* describe correctamente la especie⁵. Es también un vernáculo descriptivo del plumaje; en valenciano significa «rubita».

Otros vernáculos antiguos de la especie son *ruhilla*, recogido en Andalucía por Chapman y Buck e Irby (CARRO y BERNIS, 1972), y *bubilla*, citado para Sevilla por ARÉVALO (1887), quizás ambos procedentes del original *rubilla*, término en línea con 'rosseta' (CARRO y BERNIS, 1972); también *pato de verano*, en Málaga (ARÉVALO, 1887) y *luminica*, usado al parecer en Daimiel (CARRO y BERNIS, 1972). En el Delta del Ebro se la denomina *Sarset favadel* (MARTÍNEZ-VILALTA y MOTIS, 1989).

Otras denominaciones, citadas en catálogos ornitológicos del pasado siglo, se enmarcan en la intención de asignar a cada especie un neologismo «culto», para su uso por todos los naturalistas, castellanizando el nombre científico: *cerceta de pico estrecho* (VIDAL, 1859), *cerceta jaspeada* o *ánade jaspeado* (GUIRAO, 1859) y *ánade marmóreo*

(LÓPEZ-SEOANE, 1860).

Además de *Cerceta Pardilla*, otros nombres oficiales españoles son *Xarxet marbrenc* (Cataluña), *Cerceta pinta* (Galicia), *Zertzeta marmolairea* (País Vasco), *Rosseta* (Comunidad Valenciana) y *Sel-la marbrenca* (Baleares).

La mayoría de las denominaciones oficiales de otros países incorporan también el concepto «marmóreo-jaspeado» (*Marbled Teal*, *Sarcelle marbrée*, *Marmelente*, *Garganella marmorizzata* ...), mientras que la portuguesa (*Pardilheira*) es similar a la española.

⁴ Esta hibridación con Porrón Pardo ha ocurrido en aves cautivas del Parque Nacional de Doñana (P. Pereira, *com. pers.*). Por otra parte, en 1981 nacieron pollos de una extraña hibridación con Pato Joyuyo (*Aix sponsa*), en aves cautivas de la Cañada de los Pájaros (P. Rodríguez, *com. pers.*).

⁵ «Roseta.- Es de la grandaria de mig Pato, y de color de rosa, per lo qual se ti dona dit nom, te les pates negres.>