

Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Español: Carricerín cejudo

Catalán: Boscarla d'aigua

Vasco: Ur-benarriza

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

MUNDO: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: No nidifica. Se presenta en paso en pequeña cantidad y muy repartido, sobre todo en zonas costeras (Pontevedra, Girona, Castellón, Cantabria, Asturias, País Vasco, Menorca), aunque también en el interior (León, Navarra, Rioja, Aragón) (1). La población migrante es siempre reducida.

CE: Nidifica en unas pequeñas zonas costeras de Italia y de forma ocasional en Alemania. Migrador escaso en alguno de los otros países.

MUNDO: Aparte de las pequeñas poblaciones del sur de Europa, nidifica en un área desde Alemania de; norte hasta los Urales, descendiendo hacia el mar Negro. Inverna probablemente en Africa. Un pequeño núcleo en el Danubio (3).

HABITAT

En vegetación palustre o por lo menos en las cercanías de zonas húmedas, en juncales, carrizales, etc.

POBLACION

ESPAÑA: La población en paso no está cuantificada, pero es bastante reducida, aunque en algún punto pueda haber una migración regular.

CE: La población italiana no se ha estimado numéricamente. En Alemania oriental no pasa de 50 machos cantores (2).

MUNDO: Población global sin cuantificar.

AMENAZAS

Destrucción de hábitats, principalmente en las zonas de nidificación, por puesta en cultivo y por invasión de matorral y arbustos.

MEDIDAS DE CONSERVACION

Dada la pequeña población que atraviesa España, únicamente se pueden tomar medidas generales de conservación del hábitat.

REFERENCIAS

1. Noticiario ornitológico (1989-1990):Ardeola, 28-37.
2. Parslow, J. L. F., y Everett, M. J. (1 981): *Les oiseaux ayant besoin d'une protection spéciale en Europe*. Consejo de Europa, Estrasburgo.
3. Voous,K.H.(1960):*AtlasofEuropeanBirds*.Nelson,Londres.