

*Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)

Castellano: Chocha perdiz

Catalán: Becada

Gallego: Arcea

Vasco: Oilagorra

### **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

### **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Como nidificante, sedentario posiblemente dispersivo, existe una pequeña población en la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Pirineos. Además de Galicia, cría, al menos, en Asturias, Cantabria, Castilla-León (León, Zamora, Burgos, Soria y posiblemente Segovia), País Vasco (en las tres provincias), La Rioja, Aragón (las tres provincias), Navarra, Castilla-La Mancha (Cuenca) y Cataluña (en las tres provincias más norteñas) (1, 2). Además, llega una cantidad moderadamente grande de invernantes transpirenaicos, muy variable según los años. En Baleares sólo es común en migración e invernada, sin criar. En Canarias, nidifica una pequeña población, en las islas de Tenerife, La Palma, Gomera (3) y Hierro (4).

CE: Cría en localidades dispersas de Francia, Benelux, Dinamarca e Italia; más repartida en Gran Bretaña, Irlanda y Alemania. No cría en las islas del Mediterráneo. Migrador parcial, con invernada ya en el oeste y sur de Europa.

MUNDO: Cría en las islas atlánticas (orientales), en casi toda Europa y en una ancha franja media en Asia, que alcanza hasta Japón. También en algunas zonas aisladas del Tíbet y cercanas al mar Negro. Migrador parcial, con invernada en el Mediterráneo y en las grandes penínsulas asiáticas meridionales.

### **HABITAT**

En bosques con zonas claras y un sotobosque desarrollado. Casi siempre en bosques húmedos. En invierno, en bosques y montes con maleza crecida; en paso, también en prados húmedos, en charcas y lagunas e incluso en playas.

### **POBLACION**

ESPAÑA: La población indígena es muy reducida, de tres o cuatro millares, si bien no ha sido cuantificada exactamente. La mayor parte del área de cría está compuesta por localidades en las que crían muy pocas aves. La población canaria también es reducida (3).

CE: En Francia, menos de 1 0.000 parejas; en Bélgica, unas 1.000 parejas; Holanda, unas 2.000-3.000 parejas; en Luxemburgo, unas 320 parejas; en Dinamarca, unas 1.500-2.000 parejas; en Gran Bretaña, 18.000-46.000 parejas; Italia, unas 150 parejas (5).

MUNDO: En Europa, fuera de la CE, en Noruega, unas 35.000 parejas; en Suecia, unas 75.000 parejas; en Finlandia, 16.000 parejas. La población mundial no está cuantificada.

## AMENAZAS

Como nidificante, lo reducido de la población constituye un peligro en sí mismo. También está amenazada por la destrucción del hábitat de cría y por la caza indiscriminada, especialmente en años muy fríos.

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación del hábitat y control de la caza.

## REFERENCIAS

1. Comité Editorial *Ardeola* (1 978): Contribución al conocimiento del área de cría de *Scolopax rusticola* en España., *Ardeola*, 24: 222-227.
2. Vizoso, A., y Shorten, M. (1 978): Más datos sobre la nidificación de la Becada (*Scolopax rusticola*) en España., *Ardeola*: 24, 219-222.
3. Martín, A. (1 987): *Atlas de las Aves Nidificantes en la Isla de Tenerife*. Instituto de Estudios Canarios, Santa Cruz de Tenerife.
4. Nogales, M.; Delgado, G., y Quintero, A. (1989): "Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*). Nidificación en la isla de Hierro, Canarias". *Ardeola*, 36: 248.
5. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1982): *The Birds of the Western Palearctic. Vol. III*. Oxford University Press, Oxford.