

*Falco columbarius* Linnaeus, 1758

Castellano: Esmerejón

Catalán: Esmerla

Gallego: Falcón paxareiro

Vasco: Belatz txikia

## CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: RARA

MUNDO: NO AMENAZADA

## DISTRIBUCION

ESPAÑA: No nidifica. Migrador e invernante en la Península en pequeña cantidad. Más abundante en invierno en la Meseta norte y también en la Meseta sur y en el Valle del Ebro (1). En Baleares, en migración e invernada, raro (2). En Canarias, accidental. La migración otoñal se desarrolla desde agosto y tras la invernada el paso primaveral es entre febrero y abril.

CE: En la Comunidad nidifica únicamente en Gran Bretaña e Irlanda, donde es escaso. La invernada tiene lugar en pequeña escala en centro y sur de Europa. En las zonas occidentales de su área de cría las aves son sedentarias o dispersivas. En los países occidentales de Europa se produce ya invernada de aves más septentrionales y también de Islandia.

MUNDO: El área de cría se extiende principalmente por el norte de Europa, Islandia y las mitades septentrionales de Asia y de América del norte. Es migrador y los cuarteles de invierno más importantes se encuentran en América del norte meridional, Centroamérica, norte de Suramérica, Europa central, cuenca mediterránea, valle del Nilo, noroeste de la India y países al oeste de la misma y sureste de Asia (3).

## HABITAT

En España inverte siempre en hábitat abierto y despejado. Sobre todo ocupa estepas cerealistas, aunque también zonas húmedas, cultivos de secano en mosaico y campiñas (1). Ocasionalmente en páramos.

## POBLACION

ESPAÑA: La población invernante no está cuantificada, pero se ha estimado en unos pocos miles de ejemplares (4). Las observaciones son normalmente de individuos solitarios.

CE: En Gran Bretaña la población nidificante asciende a unas 550-650 parejas (5), con alguna decena más en

Irlanda.

MUNDO: Nidificante en Europa (aparte las islas Británicas) en Islandia, en las islas Faroes (menos de 10 parejas), en Suecia (unas 5.000 parejas), en Noruega, (muy común), en Finlandia, 2.000 parejas, y en la antigua URSS; en los países bálticos (Estonia), unas 1.600 parejas. La población del Paleártico occidental se calcula en 8.000-10.000 parejas (6). Las poblaciones americanas y asiáticas, bastante considerables.

## AMENAZAS

En España, en invierno, la amenaza más común es la caza ilegal, aunque también hay que considerar la transformación del hábitat.

En las áreas de nidificación las más importantes son la pérdida de hábitat, los efectos de plaguicidas y las perturbaciones humanas en los nidos, siendo la principal la primera de ellas, que en algunas zonas ha hecho que la especie esté al borde de la extinción.

## MEDIDAS DE CONSERVACION

En España, conservación del hábitat estepario, amenazado por la puesta en regadío. Protección efectiva contra la caza ilegal. Sería conveniente efectuar un seguimiento de la especie con el fin de determinar su situación actual y su evolución futura.

## REFERENCIAS

1. Sunyer, C., y Viñuela, J. (1990): "Migración e invernada del Esmerejón en España". *Ardeola*, 37: 279-290.
2. Mayol, J. (1978): *Els aucells de les Balears*. Moll, Palma de Mallorca.
3. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol11. Oxford University Press, Oxford.
4. De Juana, A.; De Juana, E., y Calvo, S. (1988): "La invernada de aves de presa (O. Falconiformes) en la Península Ibérica". *Invernada de aves en la Península Ibérica* (Tellería, J. L., ed.): 97-122. Sociedad Española de Ornitología, Monografía núm. 1, Madrid.
5. Bibby, C. J., y Nattrass, M. (1986): "Breeding status of the Merlin in Britain". *British Birds*, 79: 170-185.
6. Gensbol, B. (1988): *Guides des rapaces diurnes de l'Europe, du Nord de l'Afrique et du Proch Orient*. Delachaux & Niestlé, Neuchâtel-París.