



## *Columba junoniae* Hartet, 1916

Castellano: Paloma rabiche

### CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: VULNERABLE

ENDEMISMO ESPAÑOL

### DISTRIBUCION

Endémica de las Islas Canarias. Se encuentra en Tenerife, Gomera y La Palma. Su presencia en Hierro es dudosa (1, 2).

### HABITAT

Habita generalmente en bosques de laurisilva, pero también puede frecuentar pinares, pinares mixtos (pino canario y varias especies arbóreas de la laurisilva), y terrenos de cultivo del borde inferior del bosque. Cría en el suelo, en el fondo de barrancos o en repisas de paredes con una densa cobertura de helechos y otras plantas rupícolas (1).

### POBLACION

La población total de la especie ha sido estimada en unos 1.200-1.480 ejemplares, distribuidos de la siguiente forma: en Tenerife, 80-120 individuos; Gomera, 120-160; La Palma, 1.000-1.200 (1).

### AMENAZAS

Destrucción o transformación de; hábitat. Caza furtiva y la presencia de ratas en sus zonas de nidificación (1, 2).

### MEDIDAS DE CONSERVACION

Protección y restitución de su hábitat, incluyendo la reducción de las talas de laurisilva en La Palma. Intensificar la vigilancia para evitar la caza furtiva, especialmente en Tenerife y Gomera, donde las poblaciones están más amenazadas. Seguimiento periódico de sus poblaciones. Control de las ratas en las principales zonas de cría (1, 2).

### REFERENCIAS

1. Emmerson, K. W. (1985). "Estudio de la biología y ecología de la paloma turqué (*Columba bollii*) y la paloma rabiche (*Columba junoniae*) con vistas a su conservación". ICONA, Santa Cruz de Tenerife. Informe inédito.

2. Martín, A.; Hernández, E.; Nogales, M.; Quilis, V.; Trujillo, O., y Delgado, G. (1990): *Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Canarias*. Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife