



## 62 FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL

6230

Formaciones herbosas con *Nardus*, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) (\*)


*Prados vivaces de montaña de pequeña talla propios de suelos ácidos profundos siempre con cierta humedad durante todo el año.*

 Las formaciones de *Nardus stricta* están representadas mayoritariamente en las **montañas silíceas**<sup>1</sup> de toda la Península Ibérica.

 Este tipo de hábitat se desarrolla casi siempre en zonas de montaña con suelos ácidos profundos, **húmedos durante todo el año**<sup>2</sup> pero raramente encharcados, y con mayor o menor innivación: cercanías de cauces, bordes de lagos, cubetas de origen glaciar, zonas deprimidas o con cierto rezume, etc. Es una comunidad apreciada desde el punto de vista ganadero, al permanecer verde todo el año, lo que ha sido propiciado artificialmente en muchos casos al eliminar, mediante el manejo pecuario, matorrales y otros tipos de pastos. Es frecuente el contacto de este tipo de hábitat con

otros pastizales, principalmente con los del 6160.

 Estos cervunales o borreguiles forman céspedes densos dominados por el cervuno (*Nardus stricta*) en el que los demás elementos salpican la comunidad, en menor abundancia que la gramínea dominante. Entre las acompañantes habituales están *Polygala vulgaris*, *Carex panicea*, *Festuca rivularis*, *F. iberica*, *Luzula multiflora subsp. congesta*, *L. hispanica*, *L. campestris*, *Euphrasia willkommii*, *E. hirtella*, *Campanula herminii*, *Danthonia decumbens*, *Gentiana acaulis*, *G. alpina*, *Potentilla erecta*, *Pedicularis sylvatica*, etc. En el norte peninsular aparecen especies como *Carex leporina*, *C. pilulifera*, *C. pallescens*, *Festuca nigrescens*, *F. paniculata (subsp. spadicea y paniculata)*, *Gentiana*



Cervuno (*Nardus stricta*)

*pyrenaica*, etc. En Sierra Nevada aumenta la riqueza endémica, con *Festuca paniculata subsp. longiglumis*, *Potentilla nevadensis*, *Ranunculus acetosellifolius*, *R. demissus*, *Agrostis nevadensis*, *Armeria splendens*, etc.

rantes a la humedad, como los topillos lusitano (*Microtus lusitanicus*) y agreste (*M. agrestis*). Las larvas de la mariposa de montaña *Erebia epiphron* (Cantábrica y Pirineos) se alimentan de *Nardus*.

 La fauna es semejante a la de otros pastos de montaña, a veces con especies más tole-

#### CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

523010; 516040

