




RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

**RED DE NIVEL II
MEMORIA – 2015**

PARCELA 33 Qpe (PALENCIA)



Tecmena, s.l.
TECNICAS DEL MEDIO NATURAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SILVICULTURA Y MONTES
ÁREA DE INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS FORESTALES**

Clara del Rey, 22
28002 Madrid
Tel. 91 413 70 07
Fax. 91 510 20 57
correo@tecmena.com

**20
15**

Índice

1. Situación de la parcela	1
2. Caracterización de la parcela	2
2.1. Climatología	2
2.2. Geología y suelos	2
2.3. Vegetación	4
2.4. Caracterización forestal y dasométrica	5
3. Estado fitosanitario de la parcela	6
3.1. Defoliación y decoloración	6
3.2. Daños forestales	8
4. Instrumentación	19
5. Deposición atmosférica	21
5.1. pH	23
5.2. Conductividad	24
5.3. Potasio	25
5.4. Calcio	26
5.5. Magnesio	27
5.6. Sodio	28
5.7. Amonio	29
5.8. Cloro	30
5.9. Nitratos	31
5.10. Sulfatos	32
5.11. Interpretación de resultados	33
6. Calidad del aire. Inmisión	34
7. Análisis foliar	35
7.1. Macronutrientes	35
7.2. Micronutrientes	36
7.3. Interpretación de resultados	37
8. Desfronde	38
9. Fenología	40
10. Cintas diamétricas	42

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: Características de la parcela.

TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.

TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009

TABLA 4: Características dasométricas

TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela

TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela

TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados

TABLA 8: Equipos de medición instalados

TABLA 9: Parámetros descriptores de la deposición atmosférica

TABLA 10: Caracterización pH

TABLA 11: Caracterización conductividad

TABLA 12: Caracterización potasio

TABLA 13: Caracterización calcio

TABLA 14: Caracterización magnesio

TABLA 15: Caracterización sodio

TABLA 16: Caracterización amonio

TABLA 17: Caracterización cloro

TABLA 18: Caracterización nitratos

TABLA 19: Caracterización sulfatos

TABLA 20: Inmisión atmosférica

TABLA 21: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Macronutrientes

TABLA 22: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Micronutrientes

TABLA 23: Resultados medios del análisis de desfronde

TABLA 24: Resultados de la evaluación fenológica

TABLA 25: Valor medio dendrómetros

INDICE DE FIGURAS

FIG 1: Posición y vistas de la parcela

FIG 2: Climodiagrama de la parcela

FIG 3: Caracterización dasométrica de la parcela

FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media

FIG 5: Tipos de defoliación

FIG 6: Daños forestales

FIG 7: Instrumentación

FIG 8: Variación temporal de pH

FIG 9: Variación temporal de conductividad

FIG 10: Variación temporal de potasio

FIG 11: Variación temporal de calcio

FIG 12: Variación temporal de magnesio

FIG 13: Variación temporal de sodio

FIG 14: Variación temporal de amonio

FIG 15: Variación temporal de cloro

FIG 16: Variación temporal de nitratos

FIG 17: Variación temporal de sulfatos

FIG 18: Variación temporal de inmisión por dosímetros

FIG 19: Evolución de macronutrientes

FIG 20: Evolución de micronutrientes

FIG 21: Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica

FIG 22: Fases fenológicas. Inicio de fase

FIG 23: Fases fenológicas

FIG 24: Crecimiento diametral anual

1. Situación de la parcela.

La parcela representa el robledal de *Quercus petraea* del sector Campurriano-Carrionés de la provincia Orocántabrica (Rivas-Martínez).

Sus principales características se resumen en la siguiente tabla:

TABLA 1: Características de la parcela.

PARCELA	ESPECIE	PROVINCIA	T. MUNICIPAL	REPLANTEO	NIVEL
33 Qpe	<i>Quercus petraea</i>	Palencia	Cervera del Pisuerga	26/07/1994	III

LATITUD	LONGITUD	XUTM	YUTM	ALTITUD	PENDIENTE	ORIENTACIÓN	PARAJE
+42°52'00"	-04°33'00"	373.000	4.747.000	1150	22	Este	El Calejo



FIG 1: Posición y vistas de la parcela 33Qpe.

2. Caracterización de la parcela.

2.1. Climatología.

Las principales características de la parcela se dan en la siguiente tabla:

TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
T(°C)	1,2	2,2	5,1	7,4	10,4	14,3	17,2	16,9	14,2	9,9	5,0	1,9	8,8
P(mm)	100	88	94	74	77	62	28	29	55	83	119	104	912
T. Media Máximas Mes más Cálido							25,7						
-3,5		T. Media Mínimas Mes más Frío											

De acuerdo a clasificación de Allué, el clima se corresponde con un VI(IV)2 *Nemoromediterráneo genuino*.

De acuerdo a la clasificación en pisos bioclimáticos, la parcela se encuentra en el *Piso Montano*.




FIG 2: Climodiagrama de la parcela


2.2. Geología y Suelos.

Litología: *pizarras ferruginosas algo sericíticas.*

Edafología: *Cambisol eútrico / Lluvisol gléico.*


Aunque el material litológico, por su constitución, podría propiciar cierta abundancia de fracción fina, ésta no es apreciable y los suelos sin dificultad. Suelo muy pedregoso, presenta cantidad de broza sin descomponer sobre la superficie del suelo.

Cambisol eútrico:



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
A	0-30	Pardo algo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; grumoso; franco-limoso; raíces abundantes finas y medias; límite neto.
B _w	30-70	Pardo intenso (7,5 YR 4/4) en húmedo; particular; franco-limoso; raíces frecuentes; límite difuso.
BC	70-90	Pardo intenso (7,5 YR 4/4) en húmedo; particular; franco-limoso; raíces escasas; límite difuso.
C	90- *	Pardo intenso (7,5 YR 4/4) en húmedo; particular; franco-limoso; mas del 80 % de pedregosidad; sin raíces.

Luvisol gléico:



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
Aul	0-3	Pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo; grumoso, migajoso; franco-limoso; raíces abundantes finas; límite neto.
Au2	3-20	Pardo algo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; grumoso-particular; franco-limoso; raíces abundantes; límite difuso.
Bts	20-40	Pardo intenso (7,5 YR 4/6) en húmedo; particular; franco-limoso; raíces frecuentes; límite neto.
Btsg	40- *	Gris claro (2,5 Y 7/2) en húmedo; manchas bandeadas de herrumbre pardo intensas (2,5 Y 7/2); masivo; arcilloso; sin raíces.

2.3. Vegetación.

Vegetación actual: Robledal en monte alto denso de *Quercus petraea* y ejemplares de haya entremezclados con sotobosque ralo de acebos (*Ilex aquifolium*) y brezos.

TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009

	Cob		Cob
ESTRATO ARBÓREO	100,0	<i>Hieracium sp.</i>	+
<i>Fagus sylvatica L.</i>	+	<i>Ilex aquifolium L.</i>	2,0
<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>	100,0	<i>Lathyrus sp.</i>	+
ESTRATO ARBUSTIVO	2,0	<i>Linaria triornithophora (L.) Willd.</i>	+
<i>Ilex aquifolium L.</i>	2,0	<i>Luzula lactea (Link) E.H.F. Meyer</i>	+
EST. SUBARBUSTIVO-HERBACEO	12,0	<i>Melampyrum pratense L.</i>	+
<i>Anemone nemorosa L.</i>	+	<i>Melica uniflora Retz.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>	+	<i>Narcissus triandrus L.</i>	+
<i>Arenaria montana L.</i>	+	<i>Paris quadrifolia L.</i>	+
<i>Avenula marginata (Lowe) J. Holub</i>	+	<i>Physospermum cornubiense (L.) DC.</i>	+
<i>Clinopodium vulgare L.</i>	+	<i>Polygonatum multiflorum (L.) All.</i>	+
<i>Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev</i>	+	<i>Polypodium vulgare L.</i>	+
<i>Corylus avellana L.</i>	+	<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>	+
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	+	<i>Silene nutans L.</i>	+
<i>Cruciata glabra (L.) Ehrend.</i>	+	<i>Sorbus aria (L.) Crantz</i>	+
<i>Cytisus cantabricus (Willk.) Reichenb. Fil.</i>	+	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	+
<i>Deschampsia flexuosa (L.) Trin.</i>	1,0	<i>Stellaria holostea L.</i>	+
<i>Erica arborea L.</i>	+	<i>Symphytum tuberosum L.</i>	+
<i>Erythronium dens-canis L.</i>	+	<i>Vaccinium myrtillus L.</i>	+
<i>Euphorbia amygdaloides L.</i>	+	<i>Veronica officinalis L.</i>	+
<i>Fagus sylvatica L.</i>	+	<i>Viola riviniana Reichenb.</i>	+
<i>Festuca sp.</i>	+	ESTRATO MUSCINAL-LIQUENICO	0,7
<i>Galium odoratum (L.) Scop.</i>	+	<i>Dicranum scoparium Hedw.</i>	+
<i>Genista florida L.</i>	+	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	0,5
<i>Hieracium murorum</i>	+		




Vegetación potencial: La parcela se encuentra en la serie 5 b, Serie montana orocantábrica y cantabroeskalduna basófila del haya (*Fagus sylvatica*). *Carici sylvaticae-Fageto sigmetum*.

2.4. Caracterización forestal y dasométrica.

La parcela se sitúa en una masa de roble (*Quercus petraea*) de elevada densidad, por lo que de acuerdo con la normativa se replantea una subparcela de 0,08 ha, cuyas características principales se resumen a continuación:

TABLA 4: Características dasométricas. Área de la parcela, número de pies en la parcela, densidad en pies/ha, Número de pies de la especie principal, número de pies de otras especies, número de pies muertos, edad media, diámetro medio, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, altura media, altura dominante, existencias.

Parcela	Área ha	N par	N/ha	Sp.p	Otras	Muerto	Edad (años)	D med (cm)	AB (m ² /ha)	D m c (cm)	Alt m (m)	Alt do (m)	Exist (m ³ cc)
33 Qpe	0,0824	43	534	41	2	7	41-60	24,77	27,91	26,10	18,75	22,76	13,68



CD	N parc	N ha	h	Esb	Exist parc	Exist ha
7,5 - 12,5	3	36,41	11,88	118,83	0,09	1,07
12,5 - 17,5	7	84,95	15,32	102,15	0,72	8,74
17,5 - 22,5	8	97,09	17,99	89,96	1,49	18,09
22,5 - 27,5	10	121,36	19,89	79,57	2,87	34,81
27,5 - 32,5	8	97,09	21,02	70,08	3,52	42,69
32,5 - 37,5	3	36,41	21,38	61,09	1,90	23,04
37,5 - 42,5	3	36,41	20,97	52,43	2,10	25,53
42,5 - 47,5	1	12,14	19,79	43,98	0,99	12,04
47,5 - 52,5						
52,5 - 57,5						
57,5 - 62,5						
62,5 - 67,5						
> 62,5						
TOTAL	44	534			13,68	166,02

FIG 3: Distribución diamétrica de la parcela; distribución de alturas y comparación con las alturas media y dominante; relación de alturas-diámetros; frecuencias, alturas, esbelteces y existencias por clase diamétrica.

3. Estado fitosanitario de la parcela.

3.1. Defoliación y decoloración.

En la presente revisión, la parcela presenta un estado fitosanitario aceptable, con una defoliación media del 24,54%, dentro por tanto de la escala de daños ligeros, categoría en la que se han calificado casi el 80% de los pies, en lo que supone una ligera mejoría con respecto a la pasada revisión, no tanto en lo que se refiere al valor del parámetro, que con una reducción de unas pocas décimas se sitúa sin embargo por debajo del umbral de cinco que supondrían una variación significativa en términos estadísticos de acuerdo con la normativa europea en materia de redes forestales, debido sobre todo a no registrarse muertes durante esta evaluación. Obviando este hecho, el arbolado presenta una situación bastante estable sin que se registren daños de consideración,

Atendiendo a la serie histórica de datos, y tal como ya se advirtiera en años anteriores, se viene observando un cierto empeoramiento de la masa, sobre todo en el último bienio 2014-2015, tras una situación mejor y muy estable a lo largo del periodo 2006-2013, en el que no se registraron daños graves y la defoliación media se situó por debajo del 20%, alejada de los daños por sequía del año 1997 y de la muerte por decaimiento de los árboles que se encontraban en peores condiciones a partir del periodo 2001-2002, lo que indicaría –vista la relativa velocidad con que un pie con daños graves tarda en morir- una menor resiliencia de la especie.

Al igual que en revisiones anteriores, se observa que los pies más afectados son de dimensiones claramente inferiores al vuelo medio de la parcela, apareciendo afectados por falta de luz, que se configura como uno de los principales problemas del arbolado, aunque no el único.

Abundando en la idea de un estado fitosanitario muy similar al del año pasado se ha comportado la decoloración, que afecta de forma ligera a cerca de la tercera parte del arbolado, tal y como ya ocurriera en 2014.

Los principales resultados pueden verse en el gráfico adjunto:




FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media de la parcela. Serie histórica.



FIG 5: Defoliación 15%, 25% y 45%

3.2. Daños forestales.

Los principales agentes dañinos identificados se resumen en la siguiente tabla, indicándose el número de pies afectados, sus características dendrométricas, defoliación y decoloración asociadas y la diferencia con los valores medios de la parcela.

TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
ANIMALES												
Animales	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	10,00	8,40	-14,77	-10,35
Tronco	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	10,00	8,40	-14,77	-10,35
INSECTOS												
Defoliadores	42	1,00	510	97,67	25,60	0,31	0,48	0,01	24,98	18,88	0,21	0,13
Hojas	42	1,00	510	97,67	25,60	0,31	0,48	0,01	24,98	18,88	0,21	0,13
Chupadores	7	1,00	85	16,28	20,00	0,29	-5,12	-0,01	25,00	20,41	0,23	1,67
<i>Pulgonas</i>	7	1,00	85	16,28	20,00	0,29	-5,12	-0,01	25,00	20,41	0,23	1,67
Hojas	7	1,00	85	16,28	20,00	0,29	-5,12	-0,01	25,00	20,41	0,23	1,67
Mínadores	2	1,00	24	4,65	20,00	0,00	-5,12	-0,30	13,00	11,30	-11,77	-7,45
<i>Rhynchaenus fagi</i>	2	1,00	24	4,65	20,00	0,00	-5,12	-0,30	13,00	11,30	-11,77	-7,45
Hojas	2	1,00	24	4,65	20,00	0,00	-5,12	-0,30	13,00	11,30	-11,77	-7,45
Form. Agallas	3	1,00	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	22,00	16,40	-2,77	-2,35
<i>Andricus sp</i>	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	24,00	16,90	-0,77	-1,85
Ramillos <2 cm	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	24,00	16,90	-0,77	-1,85
<i>Biorhiza pallida</i>	1	1,00	12	2,33	25,00	0,00	-0,12	-0,30	26,00	18,10	1,23	-0,65
Ramillos <2 cm	1	1,00	12	2,33	25,00	0,00	-0,12	-0,30	26,00	18,10	1,23	-0,65
<i>Mikiola fagi</i>	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	16,00	14,20	-8,77	-4,55
Hojas	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	16,00	14,20	-8,77	-4,55
ENFERMEDADES												
Hongos pudrición	7	1,57	85	16,28	31,43	0,14	6,31	-0,16	18,86	17,27	-5,91	-1,47
Tronco	1	2,00	12	2,33	15,00	0,00	-10,12	-0,30	28,00	20,70	3,23	1,95
Cuello raíz	6	1,50	73	13,95	34,17	0,17	9,05	-0,13	17,33	16,70	-7,43	-2,05
Manchas hojas	3	1,00	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	25,67	17,83	0,90	-0,91
<i>Mycosphaerella mac.</i>	3	1,00	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	25,67	17,83	0,90	-0,91
Hojas	3	1,00	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	25,67	17,83	0,90	-0,91
Oidio	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
<i>Microsphaera alphitoides</i>	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
Hojas	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
AG.ABIÓTICOS												
Fact. físicos	2	1,00	24	4,65	22,50	0,00	-2,62	-0,30	27,00	17,80	2,23	-0,95
Ramas 2-10 cm	2	1,00	24	4,65	22,50	0,00	-2,62	-0,30	27,00	17,80	2,23	-0,95
Granizo	34	1,00	413	79,07	21,91	0,32	-3,21	0,02	27,24	20,15	2,47	1,41
Ramillos <2 cm	34	1,00	413	79,07	21,91	0,32	-3,21	0,02	27,24	20,15	2,47	1,41
Viento/Tornado	3	1,00	36	6,98	28,33	0,33	3,21	0,03	16,33	15,07	-8,43	-3,68
Ramas 2-10 cm	3	1,00	36	6,98	28,33	0,33	3,21	0,03	16,33	15,07	-8,43	-3,68
OTROS DAÑOS												
Bacterias	1	2,00	12	2,33	40,00	0,00	14,88	-0,30	16,00	13,40	-8,77	-5,35
Cuello raíz	1	2,00	12	2,33	40,00	0,00	14,88	-0,30	16,00	13,40	-8,77	-5,35
Falta luz	13	1,77	158	30,23	38,85	0,31	13,73	0,01	22,62	16,95	-2,15	-1,80

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Hojas	3	2,67	36	6,98	60,00	0,33	34,88	0,03	13,67	12,67	-11,10	-6,08
Ramillos <2 cm	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
Ramas 2-10 cm	3	1,00	36	6,98	23,33	0,33	-1,79	0,03	22,33	17,67	-2,43	-1,08
Ramas tam. variable	6	1,83	73	13,95	38,33	0,17	13,21	-0,13	27,50	18,61	2,73	-0,14
Inter.físicas	4	2,00	49	9,30	21,25	0,25	-3,87	-0,05	27,75	21,55	2,98	2,80
Ramas tam. variable	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	23,00	21,70	-1,77	2,95
Tronco	3	2,33	36	6,98	21,67	0,33	-3,45	0,03	29,33	21,50	4,57	2,75
Compet/Espesura	3	2,33	36	6,98	25,00	0,33	-0,12	0,03	18,67	15,63	-6,10	-3,11
Ramas 2-10 cm	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	24,00	16,90	-0,77	-1,85
Tronco	2	3,00	24	4,65	27,50	0,50	2,38	0,20	16,00	15,00	-8,77	-3,75
AG.DESCONOCIDO												
Ag.desconocido	34	1,21	413	79,07	23,38	0,41	-1,74	0,11	27,00	19,68	2,23	0,93
Hojas	19	1,16	231	44,19	23,95	0,42	-1,17	0,12	26,84	19,62	2,07	0,87
Ramas 2-10 cm	6	1,00	73	13,95	26,67	0,67	1,55	0,37	23,33	19,12	-1,43	0,37
Ramas tam. variable	3	1,00	36	6,98	20,00	0,33	-5,12	0,03	26,00	20,87	1,23	2,12
Tronco	3	1,67	36	6,98	18,33	0,33	-6,79	0,03	31,33	19,27	6,57	0,52
Cuello raíz	3	1,67	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	32,00	20,40	7,23	1,65

En cuanto al conjunto de agentes dañinos identificados destaca en primer lugar la presencia generalizada de **defoliadores** tortrícidos, presentes en casi la totalidad del arbolado muestra y asociados a la presencia de mordeduras irregulares y festoneados a lo largo del margen foliar, junto con alguna esqueletización, sin aparecer asociados a daños forestales de consideración y que tras la reducción del nivel poblacional habido el año pasado parecen recuperar el nivel de acción de hace dos años. Se advierten también pequeños refugios formados por la unión de varias hojas en el extremo de los ramillos unidas por tenues hilos de seda que confirmarían la identificación de estos defoliadores. Se observa también la acción de insectos **chupadores** sobre algo menos del 20% de la población, con una ligera reducción así con respecto al año pasado, y de quienes se ven punteaduras amarillentas en el limbo causadas por la penetración del aparato succionador que causa la desecación y decoloración alrededor del punto de inserción. Se registra también la presencia del minador *Rhynchaenus fagi* sobre las hayas, asociado a los típicos agujeros o perdigonazos en el limbo foliar causadas por la alimentación del adulto junto con las típicas minaduras triangulares en el extremo distal de la hoja debidos a la pupación de la larva; no asociado a daños forestales de consideración y que resulta casi endémico en los hayedos de la zona. En cuanto a la presencia de insectos agallícolas, nuevamente es muy frecuente la presencia de las típicas agallas piriformes de *Mikiola fagi* sobre las hayas, y en menor medida de *Andricus sp* y *Biorhiza pallida* sobre los robles, no asociadas a daños forestales de consideración.

Se han observado también algunas heridas en los troncos debidas a descorreaje de algún ciervo o corzo, frecuentes en la zona, sin mayor significación fitosanitaria.

En varios pies, y posiblemente favorecido por la humedad de la estación, se han advertido pudriciones en la base del tronco, que en algún caso sí han manifestado un cierto efecto desestabilizador del pie y que parecen expandirse notablemente con respecto a la revisión anterior, hasta afectar a más del 15% de la población, resultando mucho más peligrosas cuando afectan al cuello de la raíz que cuando se presentan sobre secciones superiores del tronco. Destaca también, como ya ocurriera el año pasado, la práctica ausencia de oidio en las hojas, causado por *Microsphaera alphitoides*, posiblemente debida a que la severa sequía del año ha impedido un buen desarrollo del hongo, que en ocasiones llegó a advertirse sobre casi todas las ramas bajas, en un patrón de comportamiento ya observado en anteriores revisiones. Cabe destacar que la pérdida de hojas ocasionada por la enfermedad aumenta la susceptibilidad a los daños por heladas; aspecto este a tener en cuenta en zonas montañas como la que nos ocupa. Se advierten también necrosis

foliares por *Mycosphaerella maculiformis*.

Como resulta lógico teniendo en cuenta la posición de la estación ecológica, se advierten roturas en ramas debidas a la acción del **viento**, que al afectar a cortas fracciones de copa, no llegan a suponer un daño considerable al hospedante, que presenta defoliaciones similares al del resto de la muestra. Estos daños pueden llegar a ser de importancia cuando se dan sobre el ápice del árbol, al afectar al desarrollo de la copa, que queda bajo el dosel principal e inicia un proceso de decaimiento por falta de luz si la masa tiene una densidad excesiva. Destaca sin embargo en la presente revisión los efectos de una fuerte **granizada** sobre casi el 80% de los pies, advirtiéndose las típicas roturas en las ramillas, debiendo destacarse que este tipo de heridas, si bien no excesivamente graves a simple vista sobre especies forestales, resultan ser en ocasiones eficaces vías de penetración para patógenos oportunistas que ven así abierto el camino a la colonización del hospedante.

Se advierten también daños por **falta de luz** en cerca de la tercera parte del arbolado, debidos sobre todo a fenómenos de autopoda en los que el árbol afectado se desprende de forma natural de la ramificación más baja para favorecer el crecimiento del ápice principal, en busca de luz, responsable en última instancia del desarrollo del árbol, y que lógicamente se concentran sobre pies de un tamaño inferior al vuelo medio de la parcela; junto con fenómenos más escasos de **interacción física** en los que el pie afectado se encuentra bien iluminado en su ápice pero experimenta dificultades en el desarrollo lateral de su ramificación por impedírsele la cercanía del arbolado colindante, junto con alguna tumoración asociada a **bacteriosis** en algún árbol, sin mayor trascendencia.

Por último, y sin que se pueda determinar la causa con precisión, se advierten **amarilleamientos** y **enrojecimientos** en las hojas de distinta naturaleza en algo menos de la mitad de la parcela, sin aparecer asociadas a defoliaciones de consideración, junto con **puntisecados** en ramillos y alguna **deformación** en los troncos sin mayor trascendencia.

El conjunto de **síntomas** y **signos** observados se resumen en la tabla adjunta

TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
HOJAS/ACÍCULAS												
Hojas	78	1,10	947	100,00	25,64	0,32	0,52	0,02	24,55	18,65	-0,22	-0,10
Comidos/perdidos	48	1,10	583	100,00	27,50	0,31	2,38	0,01	23,79	18,19	-0,98	-0,55
Agujeros/Parc. comidas	41	1,00	498	95,35	25,37	0,32	0,25	0,02	25,34	19,11	0,57	0,36
Esqueletizadas	1	1,00	12	2,33	35,00	0,00	9,88	-0,30	10,00	9,50	-14,77	-9,25
Minadas	2	1,00	24	4,65	20,00	0,00	-5,12	-0,30	13,00	11,30	-11,77	-7,45
Caída prematura	4	2,25	49	9,30	51,25	0,50	26,13	0,20	16,75	14,40	-8,02	-4,35
Dec. Verde-amarillo	19	1,16	231	44,19	22,89	0,42	-2,23	0,12	25,63	19,37	0,86	0,63
Completa	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	25,00	19,00	0,23	0,25
Punteado	7	1,00	85	16,28	20,00	0,29	-5,12	-0,01	25,00	20,41	0,23	1,67
Internervial	6	1,50	73	13,95	25,83	0,50	0,71	0,20	22,83	17,90	-1,93	-0,85
Parcial	4	1,00	49	9,30	22,50	0,50	-2,62	0,20	32,25	19,55	7,48	0,80
Paralelo nervios	1	1,00	12	2,33	30,00	1,00	4,88	0,70	21,00	20,60	-3,77	1,85
Dec. Rojo-marrón	9	1,00	109	20,93	22,22	0,11	-2,90	-0,19	27,67	20,16	2,90	1,42
Completa	5	1,00	61	11,63	23,00	0,20	-2,12	-0,10	30,00	20,99	5,23	2,24

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Punteado	3	1,00	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	25,67	17,83	0,90	-0,91
Parcial	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	22,00	23,00	-2,77	4,25
Deformaciones	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	16,00	14,20	-8,77	-4,55
Agallas	1	1,00	12	2,33	20,00	0,00	-5,12	-0,30	16,00	14,20	-8,77	-4,55
Signos hongos	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
Cob. blanca hojas	1	1,00	12	2,33	25,00	1,00	-0,12	0,70	21,00	17,70	-3,77	-1,05
RAMAS/BROTOS												
Ramillos <2 cm	37	1,00	449	86,05	22,03	0,32	-3,09	0,02	26,95	19,94	2,18	1,20
Deformaciones	2	1,00	24	4,65	22,50	0,00	-2,62	-0,30	25,00	17,50	0,23	-1,25
Otras deformaciones	2	1,00	24	4,65	22,50	0,00	-2,62	-0,30	25,00	17,50	0,23	-1,25
Rotura	33	1,00	400	76,74	21,97	0,33	-3,15	0,03	27,03	20,07	2,26	1,33
Muerto/moribundo	2	1,00	24	4,65	22,50	0,50	-2,62	0,20	27,50	20,20	2,73	1,45
Ramas 2-10 cm	15	1,00	182	34,88	25,33	0,40	0,21	0,10	22,27	17,69	-2,50	-1,05
Rotura	6	1,00	73	13,95	28,33	0,17	3,21	-0,13	19,83	15,70	-4,93	-3,05
Muerto/moribundo	9	1,00	109	20,93	23,33	0,56	-1,79	0,26	23,89	19,02	-0,88	0,28
Ramas tam. variable	10	1,50	121	23,26	31,00	0,20	5,88	-0,10	26,60	19,60	1,83	0,85
Rotura	2	1,00	24	4,65	17,50	0,50	-7,62	0,20	24,00	20,80	-0,77	2,05
Muerto/moribundo	8	1,63	97	18,60	34,38	0,13	9,26	-0,18	27,25	19,29	2,48	0,55
TRONCO/C.RAÍZ												
Tronco	10	2,10	121	23,26	21,00	0,30	-4,12	0,00	25,20	18,14	0,43	-0,61
Deformaciones	3	1,67	36	6,98	18,33	0,33	-6,79	0,03	31,33	19,27	6,57	0,52
Otras deformaciones	3	1,67	36	6,98	18,33	0,33	-6,79	0,03	31,33	19,27	6,57	0,52
Heridas	4	2,00	49	9,30	21,25	0,25	-3,87	-0,05	24,50	18,23	-0,27	-0,52
Descortezamientos	4	2,00	49	9,30	21,25	0,25	-3,87	-0,05	24,50	18,23	-0,27	-0,52
Pudriciones	1	2,00	12	2,33	15,00	0,00	-10,12	-0,30	28,00	20,70	3,23	1,95
Inclinado	2	3,00	24	4,65	27,50	0,50	2,38	0,20	16,00	15,00	-8,77	-3,75
Cuello raíz	10	1,60	121	23,26	31,00	0,10	5,88	-0,20	21,60	17,48	-3,17	-1,27
Deformaciones	4	1,75	49	9,30	26,25	0,00	1,13	-0,30	28,00	18,65	3,23	-0,10
Otras deformaciones	3	1,67	36	6,98	21,67	0,00	-3,45	-0,30	32,00	20,40	7,23	1,65
Tumores	1	2,00	12	2,33	40,00	0,00	14,88	-0,30	16,00	13,40	-8,77	-5,35
Pudriciones	6	1,50	73	13,95	34,17	0,17	9,05	-0,13	17,33	16,70	-7,43	-2,05

Por último, se presenta a continuación la relación entre agentes dañinos identificados y los distintos síntomas observados.

TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados.

	N par	Animales		Defoliadores		Chupadores		Minadores	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS									
Hojas	78			42	100,00	7	100,00	2	100,00
Comidos/perdidos	48			42	100,00			2	100,00
Agujeros/Parc. comidas	41			41	97,62				
Esqueletizadas	1			1	2,38				
Minadas	2							2	100,00
Caída prematura	4								
Dec. Verde-amarillo	19					7	100,00		
Completa	1								

	N par	Animales		Defoliadores		Chupadores		Minadores	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Punteado	7					7	100,00		
Internervial	6								
Parcial	4								
Paralelo nervios	1								
Dec. Rojo-marrón	9								
Completa	5								
Punteado	3								
Parcial	1								
Deformaciones	1								
Agallas	1								
Signos hongos	1								
Cob. blanca hojas	1								
RAMAS/BROTES									
Ramillos <2 cm	37								
Deformaciones	2								
Otras deformaciones	2								
Rotura	33								
Muerto/moribundo	2								
Ramas 2-10 cm	15								
Rotura	6								
Muerto/moribundo	9								
Ramas tam. variable	10								
Rotura	2								
Muerto/moribundo	8								
TRONCO/C.RAÍZ									
Tronco	10	1	100,00						
Deformaciones	3								
Otras deformaciones	3								
Heridas	4	1	100,00						
Descortezamientos	4	1	100,00						
Pudriciones	1								
Inclinado	2								
Cuello raíz	10								
Deformaciones	4								
Otras deformaciones	3								
Tumores	1								
Pudriciones	6								

	N par	Form. Agallas		Hongos pudrición		Manchas hojas		Oidio	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS									
Hojas	78	1	33,33			3	100,00	1	100,00
Comidos/perdidos	48								
Agujeros/Parc. comidas	41								
Esqueletizadas	1								
Minadas	2								
Caída prematura	4								
Dec. Verde-amarillo	19								
Completa	1								

	N par	Form. Agallas		Hongos pudrición		Manchas hojas		Oidio	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Punteado	7								
Internerval	6								
Parcial	4								
Paralelo nervios	1								
Dec. Rojo-marrón	9					3	100,00		
Completa	5								
Punteado	3					3	100,00		
Parcial	1								
Deformaciones	1	1	33,33						
Agallas	1	1	33,33						
Signos hongos	1							1	100,00
Cob. blanca hojas	1							1	100,00
RAMAS/BROTOS									
Ramillos <2 cm	37	2	66,67						
Deformaciones	2	2	66,67						
Otras deformaciones	2	2	66,67						
Rotura	33								
Muerto/moribundo	2								
Ramas 2-10 cm	15								
Rotura	6								
Muerto/moribundo	9								
Ramas tam. variable	10								
Rotura	2								
Muerto/moribundo	8								
TRONCO/C.RAÍZ									
Tronco	10			1	14,29				
Deformaciones	3								
Otras deformaciones	3								
Heridas	4								
Descortezamientos	4								
Pudriciones	1			1	14,29				
Inclinado	2								
Cuello raíz	10			6	85,71				
Deformaciones	4								
Otras deformaciones	3								
Tumores	1								
Pudriciones	6			6	85,71				

	N par	Fact. físicos		Granizo		Viento/Tornado		Bacterias	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS									
Hojas	78								
Comidos/perdidos	48								
Agujeros/Parc. comidas	41								
Esqueletizadas	1								
Minadas	2								
Caída prematura	4								
Dec. Verde-amarillo	19								
Completa	1								


	N par	Fact. físicos		Granizo		Viento/Tornado		Bacterias	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Punteado	7								
Internervial	6								
Parcial	4								
Paralelo nervios	1								
Dec. Rojo-marrón	9								
Completa	5								
Punteado	3								
Parcial	1								
Deformaciones	1								
Agallas	1								
Signos hongos	1								
Cob. blanca hojas	1								
RAMAS/BROTOS									
Ramillos <2 cm	37			34	100,00				
Deformaciones	2								
Otras deformaciones	2								
Rotura	33			33	97,06				
Muerto/moribundo	2			1	2,94				
Ramas 2-10 cm	15	2	100,00			3	100,00		
Rotura	6	2	100,00			3	100,00		
Muerto/moribundo	9								
Ramas tam. variable	10								
Rotura	2								
Muerto/moribundo	8								
TRONCO/C.RAÍZ									
Tronco	10								
Deformaciones	3								
Otras deformaciones	3								
Heridas	4								
Descortezamientos	4								
Pudriciones	1								
Inclinado	2								
Cuello raíz	10							1	100,00
Deformaciones	4							1	100,00
Otras deformaciones	3								
Tumores	1							1	100,00
Pudriciones	6								











	N par	Falta luz		Inter.físicas		Compet/Espesura		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS									
Hojas	78	3	23,08					19	55,88
Comidos/perdidos	48	3	23,08					1	2,94
Agujeros/Parc. comidas	41								
Esqueletizadas	1								
Minadas	2								
Caída prematura	4	3	23,08					1	2,94
Dec. Verde-amarillo	19							12	35,29
Completa	1							1	2,94

	N par	Falta luz		Inter.físicas		Compet/Espesura		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Punteado	7								
Internervial	6							6	17,65
Parcial	4							4	11,76
Paralelo nervios	1							1	2,94
Dec. Rojo-marrón	9							6	17,65
Completa	5							5	14,71
Punteado	3								
Parcial	1							1	2,94
Deformaciones	1								
Agallas	1								
Signos hongos	1								
Cob. blanca hojas	1								
RAMAS/BROTOS									
Ramillos <2 cm	37	1	7,69						
Deformaciones	2								
Otras deformaciones	2								
Rotura	33								
Muerto/moribundo	2	1	7,69						
Ramas 2-10 cm	15	3	23,08			1	33,33	6	17,65
Rotura	6							1	2,94
Muerto/moribundo	9	3	23,08			1	33,33	5	14,71
Ramas tam. variable	10	6	46,15	1	25,00			3	8,82
Rotura	2			1	25,00			1	2,94
Muerto/moribundo	8	6	46,15					2	5,88
TRONCO/C.RAÍZ									
Tronco	10			3	75,00	2	66,67	3	8,82
Deformaciones	3							3	8,82
Otras deformaciones	3							3	8,82
Heridas	4			3	75,00				
Descortezamientos	4			3	75,00				
Pudriciones	1								
Inclinado	2					2	66,67		
Cuello raíz	10							3	8,82
Deformaciones	4							3	8,82
Otras deformaciones	3							3	8,82
Tumores	1								
Pudriciones	6								



FIG 6: Daños por defoliadores en robles. Agallas de *Biorhiza pallida* en ramillos. Minaduras de larvas de *Rhynchaenus fagi* en hayas. Agallas foliares de *Mikiola fagi*.



MODELOS DE DEFOLIACION		
		
2006	2007	2008
		
2009	2010	2011
		
2012	2013	2014
		
2015		

Los dos principales parámetros para evaluar el estado de salud en masas forestales son la **defoliación** y **decoloración**

DEFOLIACION: se entiende por defoliación la pérdida de hojas/acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable, es decir, eliminando del proceso de estima la copa muerta (ramas y ramillos claramente muertos) y la parte de la copa con ramas secas por poda natural o competencia.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de defoliación o daño:

- ✓ **Arboles sin daño:** defoliación 0-10%
- ✓ **Ligeramente dañados:** defoliación 15-25%
- ✓ **Moderadamente dañados:** defoliación 30-60%
- ✓ **Gravemente dañados:** defoliación 65-95%
- ✓ **Arboles muertos:** defoliación 100%

DECOLORACION: se entiende por decoloración, la aparición de coloraciones anormales en la totalidad del follaje o en una parte apreciable del mismo, utilizándose en su evaluación un criterio subjetivo que implica el conocimiento del medio forestal correspondiente por parte del evaluador.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de decoloración:

- ✓ **Clase 0:** decoloración nula
- ✓ **Clase 1:** decoloración ligera
- ✓ **Clase 2:** decoloración moderada
- ✓ **Clase 3:** decoloración grave



4. Instrumentación.

Para el seguimiento intensivo y continuo de la parcela están instalados los siguientes equipos de medición:

TABLA 8: Equipos de medición instalados en la parcela. Periodicidad quincenal 1997-2011; Mensual desde 2012

Variable	Equipo	Parcela Interior	Parcela Exterior	Instalación	Periodicidad
Meteorología	Torre meteorológica		1	1997	Quincenal/Mensual
	Placa solar		1		
	Meteodata		1		
	Anemómetro		1		
	Veleta		1		
	Piranómetro		1		
	Termómetro		1		
	Sonda Humedad		1		
	Pluviómetro		1		
Precipitación incidente	Acumuladores		4	1997	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro		1		
	Captador nieve		1		
Trascolación	Acumuladores	6		1997	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro	1			
	Captador nieve	1			
Desfronde	Captadores desfronde	4		1999	Quincenal/Mensual
Solución del suelo	Lisímetros	8		1998	Quincenal/Mensual
Inmisión	Dosímetros pasivos		12	2000	Quincenal/Mensual
Crecimiento	Dialdendro en continuo	15		1999	Quincenal/Mensual
Fenología	Árboles de seguimiento	20		1998	Quincenal/Mensual



FIG 7: Parcela exterior. Captadores. Data-logger. Parcela interior. Acumuladores de deposición, captador de desfronde, caja de lisímetros. Parcela exterior y torre meteorológica.

5. Deposición atmosférica.

La **deposición atmosférica** es un conjunto de procesos que conducen al depósito de materiales ajenos (a través de hidrometeoros, aerosoles o movimientos de gases) sobre la superficie descubierta del suelo o sobre la superficie exterior de árboles y plantas (troncos, ramas y hojas). La deposición depende de la concentración de contaminantes en una estación y momento determinados, lo que a su vez es función de la situación y actividad de las fuentes de emisión (grandes núcleos urbanos o industrias) así como de las condiciones atmosféricas, que determinan no sólo el movimiento de los contaminantes sino la reactividad entre los mismos.

La deposición atmosférica total consta de tres componentes:

- ✓ **Deposición seca:** depósito directo de los contaminantes sobre la superficie del suelo, el agua y la vegetación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas próximas a los focos de emisión.
- ✓ **Deposición húmeda:** depósito arrastrado hacia el ecosistema por la lluvia o la nieve. Previa unión de los contaminantes a las nubes o gotas de precipitación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas alejadas de los focos de emisión.
- ✓ **Deposición por nubes, niebla y oculta:** la vegetación intercepta directamente el agua y los contaminantes de las nubes, niebla, rocío y escarcha.

Para desarrollar un programa de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los bosques, uno de los objetivos principales del programa, es necesario disponer de una estimación de la cantidad de contaminantes que entran periódicamente por unidad de superficie. Como sistema de medición más económico y eficaz se ha desarrollado el **método de trascolación**, empleado en todo el sistema ICP-Forests, que permite la estimación de las deposiciones total y seca, el cálculo de la deposición húmeda y la caracterización de los procesos de interacción entre los contaminantes que tienen lugar dentro del arbolado.

Para caracterizar la deposición se toman como vías de entrada al ecosistema:

- ✓ **Precipitación en campo abierto:** denominada también precipitación incidente o *bulk deposition*, que llega al suelo directamente desde el cielo, sin atravesar el dosel arbóreo y que se corresponde con la deposición húmeda
- ✓ **Precipitación bajo dosel arbóreo:** denominada también trascolación o *throughfall* en la que se recoge el agua que llega al suelo tras atravesar el follaje de la masa forestal, tras mojar la superficie de las copas e interactuar con ellas, arrastrando parte de la deposición seca previamente caída, así como la precipitación húmeda.

La toma de muestras se hace en una batería de colectores normalizados situados a campo abierto y bajo cubierta arbórea y se analizan en una serie de laboratorios de referencia convenientemente intercalibrados entre sí, a través de un exhaustivo sistema de control y aseguramiento de calidad, de forma que resulten intercomparables y coherentes entre sí los resultados obtenidos en los países integrantes del programa. Para el cálculo de la deposición hay que tener en cuenta tanto la cantidad de precipitación al ecosistema como la concentración de los diferentes solutos en la misma.

Como variables de medición de la deposición, el manual considera los siguientes parámetros:

TABLA 9: parámetros descriptores de la deposición atmosférica en los ecosistemas forestales del Programa ICP-Forests.

Variable	Descripción	Valores de referencia RTSAP(*)
pH	Medida de la acidez o basicidad. Se considera lluvia ácida con valores $\leq 5,65$.	6,5 – 9,5
Conductividad	Índice de la presencia general de solutos en el agua.	$\leq 2.500 \mu\text{S/cm}$
Calcio	Elementos que se encuentran en el agua de lluvia debido fundamentalmente a su origen terrígeno, al formar parte de la mayoría de los suelos, especialmente en zonas de terreno calizo.	n.d
Magnesio		n.d
Potasio		n.d
Sodio	Elementos de origen marino, dependiendo su presencia de la distancia a la línea de costa. Papel tóxico en la vegetación	200 mg/l
Cloro		250 mg/l
Amonio	Procede de emisiones contaminantes a la atmósfera fundamentalmente de actividades agrícolas o ganaderas. Papel en la acidificación de los suelos.	0,50 mg/l
Nitratos	Producidos por la actividad industrial, doméstica y de transporte, ligados a procesos de combustión y responsables de la acidificación de la deposición que llega a los ecosistemas forestales. Papel precursor (N) en la formación de ozono, contaminante secundario en forma de aerosol.	50 mg/l
Sulfatos		250 mg/l

(*)RTSAP: Reglamento Técnico-Sanitario de Aguas Potables.

Se caracteriza a continuación la deposición atmosférica en la parcela 33Qpe, pasando revista a la evolución de los distintos parámetros a lo largo de la series histórica estudiada, haciendo la salvedad de que se trata de años completos, a excepción de los años 1997 (mayo-diciembre); 2012 (enero-julio) y 2014 (abril-diciembre), por lo que caben ciertas anomalías.

De cada parámetro se da el comportamiento del parámetro, la diferencia existente entre trascolación (bajo cubierta arbórea) y precipitación incidente (a campo abierto), lo que da idea tanto del papel del arbolado como sumidero como de la incidencia de la deposición seca, así como la distribución por trimestres de cada deposición, con objeto de caracterizar una posible tendencia temporal en el aporte de polutentes al ecosistema.

5.1. pH.

TABLA 10: Caracterización pH. Media anual ponderada por volumen (en rojo valores anuales < 5,65), porcentaje de muestreos en los que se ha obtenido pH < 5,65 (lluvia ácida), precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997	6,05	23,08	723	5,68	69,23	1074	5,95	6,27
1998	5,66	37,50	618	5,86	25,00	869	5,84	6,21
1999	6,30	4,55	937	6,57	0,00	1266	6,19	6,48
2000	5,84	19,05	1350	5,83	38,10	1617	6,07	6,27
2001	5,90	11,76	1155	5,81	38,89	1364	5,86	6,00
2002	6,40	5,56	1036	6,43	10,00	1561	6,41	6,54
2003	5,94	13,04	1185	6,05	12,50	1435	6,17	6,21
2004	6,23	35,71	761	5,94	46,67	953	6,19	6,13
2005	6,06	37,50	436	5,76	53,33	628	6,01	5,98
2006	6,21	15,00	1050	6,05	26,32	1472	6,13	6,07
2007	6,01	28,57	796	5,58	40,91	1102	6,01	5,79
2008	5,90	27,27	959	5,80	36,36	1264	6,14	5,99
2009	6,10	0,00	828	6,08	0,00	1178	6,14	6,13
2010	6,21	0,00	1390	6,04	0,00	1912	6,22	6,19
2011	5,93	25,00	707	5,84	33,33	1028	6,10	6,04
2012	6,09	14,29	302	5,71	28,57	347	5,96	5,98
2014	6,19	0,00	648	6,03	12,50	941	6,17	6,16
Media	6,06	17,52	875,35	5,94	27,75	1177,09	6,09	6,14




FIG 8: Variación temporal de pH, porcentaje de lluvia ácida, precipitación e intercepción

5.2. Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$).

TABLA 11: Caracterización Conductividad. Media anual ponderada por volumen, precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997	37,91		723	22,95		1074	25,59	22,11
1998	13,58		618	8,91		869	29,47	22,63
1999	13,71		937	12,37		1266	33,24	19,93
2000	14,35		1350	12,56		1617	35,37	22,07
2001	9,39		1155	8,49		1364	28,43	16,06
2002	19,57		1036	14,63		1561	49,05	30,17
2003	17,93		1185	17,01		1435	46,47	25,27
2004	32,82		761	29,96		953	63,98	37,20
2005	22,19		436	17,18		628	65,86	30,61
2006	18,37		1050	15,02		1472	61,93	28,83
2007	21,64		796	16,51		1102	50,03	28,98
2008	13,63		959	8,55		1264	46,84	22,94
2009	11,62		828	8,67		1178	49,56	20,18
2010	10,36		1390	7,47		1912	44,44	15,09
2011	13,53		707	19,43		1028	51,52	19,09
2012	12,50		302	9,75		347	53,38	20,50
2014	8,87		648	5,00		941	28,66	15,29
Media	17,18		875,35	13,79		1177,09	44,93	23,35




FIG 9: Variación temporal de la conductividad.

5.3. Potasio.

TABLA 12: Caracterización Potasio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	1,76	12,66	723	0,33	3,54	1074	9,12	7,33	5,18
1998	2,33	14,41	618	1,45	12,56	869	1,85	19,45	13,28
1999	1,59	14,90	937	1,44	18,18	1266	-3,28	17,99	11,86
2000	2,00	27,02	1350	1,88	30,37	1617	-3,35	22,33	15,28
2001	1,22	14,03	1155	0,96	12,99	1364	1,03	16,00	9,92
2002	1,45	15,01	1036	0,68	10,32	1561	4,69	19,36	7,73
2003	1,57	18,52	1185	0,39	5,59	1435	12,93	12,93	3,83
2004	2,74	18,06	761	0,84	6,94	953	11,12	16,14	4,88
2005	2,02	8,80	436	0,63	3,99	628	4,82	12,47	5,15
2006	1,77	18,59	1050	0,91	13,36	1472	5,23	19,14	9,86
2007	2,15	17,02	796	0,75	8,23	1102	8,79	20,44	7,92
2008	1,66	15,87	959	0,43	5,44	1264	10,43	22,97	6,57
2009	1,06	8,74	828	0,92	10,75	1178	-2,01	18,05	4,28
2010	1,03	14,26	1390	0,47	9,04	1912	5,21	21,96	3,59
2011	1,31	9,29	707	0,21	2,11	1028	7,18	18,92	5,75
2012	0,55	1,65	302	0,19	0,66	347	0,99	2,99	0,92
2014	1,50	9,73	648	0,08	0,74	941	8,99	12,25	1,58
Media	1,63	14,03	875,35	0,74	9,11	1177,09	4,93	16,51	6,92




FIG 10: Variación temporal de deposición de K, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.4. Calcio.

TABLA 13: Caracterización Calcio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,79	5,65	723	0,37	3,98	1074	1,67	7,29	5,16
1998	0,55	3,41	618	0,28	2,42	869	0,99	6,91	4,05
1999	0,64	6,00	937	0,37	4,73	1266	1,27	10,77	6,68
2000	0,49	6,58	1350	0,43	6,98	1617	-0,40	10,94	7,70
2001	0,34	3,94	1155	0,23	3,07	1364	0,87	8,58	6,22
2002	0,63	6,55	1036	0,44	6,90	1561	-0,35	12,23	9,40
2003	3,11	36,80	1185	3,40	48,81	1435	-12,01	23,45	26,64
2004	2,02	13,35	761	2,70	22,42	953	-9,07	18,95	20,04
2005	1,14	4,96	436	1,27	7,99	628	-3,03	11,17	9,81
2006	0,92	9,62	1050	0,78	11,49	1472	-1,86	17,51	16,49
2007	1,00	7,88	796	0,98	10,77	1102	-2,88	18,16	14,99
2008	0,61	5,85	959	0,40	5,04	1264	0,81	14,94	12,47
2009	0,42	3,48	828	0,36	4,18	1178	-0,70	10,43	6,81
2010	0,38	5,30	1390	0,32	6,16	1912	-0,86	11,50	7,59
2011	0,61	4,31	707	0,41	4,20	1028	0,10	11,32	6,29
2012	0,75	2,28	302	0,50	1,73	347	0,54	3,22	2,60
2014	0,72	4,67	648	0,43	4,08	941	0,59	8,87	6,09
Media	0,89	7,68	875,35	0,80	9,11	1177,09	-1,43	12,13	9,94




FIG 11: Variación temporal de deposición de Ca, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.5. Magnesio.

TABLA 14: Caracterización Magnesio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,24	1,75	723	0,16	1,68	1074	0,06	3,66	3,20
1998	0,33	2,04	618	0,22	1,92	869	0,12	4,07	2,78
1999	0,21	1,95	937	0,17	2,16	1266	-0,21	4,18	2,58
2000	0,12	1,59	1350	0,11	1,33	1617	0,27	3,46	1,84
2001	0,18	1,01	1155	0,13	0,62	1364	0,39	2,99	1,45
2002	0,13	1,27	1036	0,11	1,07	1561	0,20	3,93	1,83
2003	0,19	1,74	1185	0,19	0,99	1435	0,75	3,97	1,65
2004	0,33	2,17	761	0,57	4,74	953	-2,58	4,03	2,51
2005	0,19	0,65	436	0,13	0,41	628	0,23	2,73	1,01
2006	0,17	1,41	1050	0,15	0,63	1472	0,78	4,06	1,94
2007	0,19	1,53	796	0,16	0,68	1102	0,85	4,56	2,17
2008	0,18	1,02	959	0,12	0,38	1264	0,64	3,99	1,87
2009	0,11	0,88	828	0,05	0,61	1178	0,27	3,95	1,67
2010	0,11	1,58	1390	0,07	1,36	1912	0,22	4,42	1,89
2011	0,13	0,92	707	0,04	0,45	1028	0,47	3,98	1,27
2012	0,21	0,63	302	0,36	1,25	347	-0,62	2,35	1,52
2014	0,14	0,90	648	0,03	0,31	941	0,59	1,96	0,77
Media	<i>0,19</i>	<i>1,35</i>	<i>875,35</i>	<i>0,16</i>	<i>1,21</i>	<i>1177,09</i>	<i>0,14</i>	<i>3,66</i>	<i>1,88</i>




FIG 12: Variación temporal de deposición de Mg, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.6. Sodio.

TABLA 15: Caracterización Sodio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,31	2,19	723	0,22	2,40	1074	-0,21	6,07	6,65
1998	0,46	2,85	618	0,40	3,46	869	-0,61	11,74	10,50
1999	0,88	8,27	937	0,93	11,75	1266	-3,48	19,31	13,85
2000	0,66	8,97	1350	0,67	10,86	1617	-1,89	18,12	13,02
2001	0,42	4,79	1155	0,47	6,43	1364	-1,63	18,38	12,14
2002	0,95	9,83	1036	0,78	12,23	1561	-2,41	28,50	18,75
2003	0,59	6,94	1185	0,62	8,89	1435	-1,95	22,49	12,86
2004	1,91	12,59	761	2,10	17,39	953	-4,80	22,85	13,75
2005	0,61	2,67	436	0,44	2,74	628	-0,07	14,42	7,16
2006	0,73	7,68	1050	0,64	9,43	1472	-1,75	24,17	16,07
2007	0,58	4,61	796	0,48	5,24	1102	-0,63	23,14	14,21
2008	0,34	3,23	959	0,29	3,62	1264	-0,39	19,63	11,01
2009	0,44	3,67	828	0,38	4,49	1178	-0,82	22,09	12,27
2010	0,43	5,93	1390	0,40	7,72	1912	-1,79	24,37	13,76
2011	0,76	5,37	707	0,13	1,36	1028	4,00	20,72	5,97
2012	0,37	1,10	302	0,74	2,57	347	-1,47	4,35	2,86
2014	0,28	1,81	648	0,23	2,12	941	-0,31	7,06	4,77
Media	0,63	5,44	875,35	0,58	6,63	1177,09	-1,19	18,08	11,15




FIG 13: Variación temporal de deposición de Na, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.7. Amonio.

TABLA 16: Caracterización Amonio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,18	1,28	723	0,25	2,65	1074	-1,37	1,81	8,19
1998	0,33	2,03	618	0,28	2,43	869	-0,40	2,24	8,36
1999	0,18	1,68	937	0,25	3,15	1266	-1,47	2,71	3,66
2000	0,37	3,39	1350	0,28	4,55	1617	-1,16	2,48	4,26
2001	0,19	2,18	1155	0,19	2,58	1364	-0,40	1,86	1,82
2002	0,28	2,16	1036	0,26	4,04	1561	-1,89	2,43	2,91
2003	0,28	3,07	1185	0,33	4,67	1435	-1,61	3,06	3,10
2004	0,86	6,33	761	0,32	3,04	953	3,29	4,12	3,23
2005	0,39	1,54	436	0,34	2,11	628	-0,58	2,41	1,80
2006	0,25	2,58	1050	0,29	4,32	1472	-1,73	3,62	3,05
2007	0,45	3,26	796	0,29	3,21	1102	0,05	3,53	3,58
2008	0,30	2,62	959	0,27	2,99	1264	-0,37	2,91	2,62
2009	0,25	2,10	828	0,13	1,32	1178	0,78	2,73	1,82
2010	0,16	2,25	1390	0,15	2,93	1912	-0,68	3,12	2,09
2011	0,48	3,39	707	0,41	4,22	1028	-0,83	4,36	3,15
2012	0,67	2,02	302	0,53	1,85	347	0,18	2,26	2,06
2014	0,50	3,21	648	0,30	2,81	941	0,40	4,22	3,26
Media	0,36	2,65	875,35	0,29	3,11	1177,09	-0,46	2,93	3,47




FIG 14: Variación temporal de deposición de amonio, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.8. Cloro.

TABLA 17: Caracterización Cloro. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,51	3,68	723	0,55	5,87	1074	-2,19	10,88	10,93
1998	0,75	4,62	618	0,53	4,64	869	-0,02	19,88	16,27
1999	1,08	10,15	937	0,88	11,08	1266	-0,93	36,56	23,56
2000	0,60	8,15	1350	0,41	6,62	1617	1,54	28,62	15,70
2001	0,71	8,17	1155	0,73	8,60	1364	-0,44	32,37	19,20
2002	1,23	12,74	1036	1,17	18,20	1561	-5,46	44,79	24,88
2003	1,04	12,29	1185	1,73	24,88	1435	-12,59	39,97	31,89
2004	2,35	17,85	761	3,82	36,25	953	-18,41	47,45	37,43
2005	1,77	7,72	436	2,17	13,66	628	-5,94	28,61	21,76
2006	1,67	17,57	1050	1,74	25,61	1472	-8,04	49,90	41,76
2007	1,57	12,45	796	1,98	21,76	1102	-9,31	45,78	37,79
2008	1,01	9,63	959	0,82	10,42	1264	-0,79	40,90	30,60
2009	0,81	6,68	828	0,77	8,97	1178	-2,30	45,08	25,80
2010	0,78	10,81	1390	0,68	13,07	1912	-2,26	41,17	21,32
2011	0,57	3,83	707	0,36	3,49	1028	0,33	29,44	13,12
2012	0,82	2,47	302	0,47	1,62	347	0,85	11,34	5,87
2014	0,24	1,54	648	0,12	1,12	941	0,43	6,22	3,12
Media	<i>1,03</i>	<i>8,84</i>	<i>875,35</i>	<i>1,11</i>	<i>12,70</i>	<i>1177,09</i>	<i>-3,85</i>	<i>32,88</i>	<i>22,41</i>




FIG 15: Variación temporal de deposición de Cl, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.9. Nitratos.

TABLA 18: Caracterización Nitratos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,47	3,40	723	0,20	2,12	1074	1,29	2,24	2,13
1998	0,27	1,68	618	0,20	1,78	869	-0,10	3,67	2,27
1999	0,27	2,49	937	0,23	2,88	1266	-0,39	4,43	2,94
2000	0,23	2,86	1350	0,17	2,47	1617	0,39	3,79	2,38
2001	0,15	1,44	1155	0,20	1,98	1364	-0,54	3,51	2,09
2002	0,27	2,77	1036	0,23	3,09	1561	-0,32	4,15	2,84
2003	0,29	3,05	1185	0,26	3,76	1435	-0,71	5,39	2,74
2004	0,34	2,59	761	0,35	3,31	953	-0,72	6,93	3,28
2005	0,33	1,43	436	0,24	1,52	628	-0,09	4,31	1,83
2006	0,35	3,71	1050	0,20	2,87	1472	0,84	5,54	2,75
2007	0,24	1,93	796	0,19	2,06	1102	-0,13	5,06	2,96
2008	0,22	2,11	959	0,19	2,38	1264	-0,27	4,72	3,38
2009	0,17	1,42	828	0,10	1,14	1178	0,29	3,87	1,87
2010	0,13	1,14	1390	0,17	3,32	1912	-2,18	1,87	2,37
2011	0,66	4,45	707	0,54	5,26	1028	-0,81	7,76	4,61
2012	0,33	0,99	302	0,29	1,02	347	-0,03	1,65	0,99
2014	0,38	2,46	648	0,14	1,29	941	1,17	2,70	1,48
Media	0,30	2,35	875,35	0,23	2,48	1177,09	-0,14	4,21	2,52




FIG 16: Variación temporal de deposición de nitratos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.10. Sulfatos.

TABLA 19: Caracterización Sulfatos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,48	3,47	723	0,43	4,57	1074	-1,10	3,00	3,70
1998	0,60	3,72	618	0,46	3,96	869	-0,24	5,81	5,79
1999	0,53	4,99	937	0,45	5,68	1266	-0,69	7,17	6,35
2000	0,37	5,05	1350	0,29	4,67	1617	0,38	6,42	4,57
2001	0,30	3,39	1155	0,36	4,28	1364	-0,89	5,68	4,11
2002	0,49	5,08	1036	0,43	6,70	1561	-1,62	7,73	6,07
2003	0,49	5,78	1185	0,41	5,93	1435	-0,15	6,85	4,80
2004	0,84	6,34	761	0,71	6,70	953	-0,36	8,72	5,84
2005	0,52	2,27	436	0,41	2,55	628	-0,28	4,69	3,12
2006	0,46	4,80	1050	0,33	4,80	1472	0,01	6,80	4,69
2007	0,46	3,63	796	0,33	3,63	1102	0,00	7,24	5,12
2008	0,19	1,67	959	0,18	2,25	1264	-0,58	4,49	2,61
2009	0,17	1,39	828	0,12	1,41	1178	-0,02	4,67	3,32
2010	0,12	1,64	1390	0,11	2,11	1912	-0,47	4,27	2,88
2011	0,41	2,76	707	0,35	3,47	1028	-0,71	5,93	4,57
2012	0,38	1,16	302	0,35	1,21	347	-0,05	1,84	1,35
2014	0,23	1,50	648	0,18	1,67	941	-0,17	2,25	2,07
Media	0,41	3,45	875,35	0,35	3,86	1177,09	-0,41	5,50	4,17




FIG 17: Variación temporal de deposición de sulfatos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.11. Interpretación de resultados.

En cuanto a la deposición atmosférica y por lo que se refiere a la parcela 33Qpe, cabe destacar:

En cuanto al **pH**, se observan valores similares a los medios de la red, algo más ácidos por lo que se refiere a la precipitación a cielo abierto, deposición en la que se han observado las mayores frecuencias de lluvia ácida, si bien éstas han seguido una tendencia descendente a lo largo de los últimos años. La intercepción provocada por la cubierta arbórea se ha situado en el entorno del 25%.

Por lo que se refiere a la **conductividad**, se advierten valores comparativamente bajos, inferiores a los valores medios de la red y en descenso desde el máximo local de 2011.

En cuanto al **potasio**, presenta también en general valores similares a los de la media, sobrepasándolos ligeramente en ocasiones salpicadas, sobre todo por lo que se refiere a la deposición a campo abierto, que resulta ser casi siempre inferior a los valores de trascolación, lo que posiblemente estaría relacionado con los efectos de la deposición seca.

El **calcio** tras el considerable pico experimentado en 2003-2004 ha tendido a estabilizarse por debajo de los 10 kg/ha y valores en general por debajo de la media de la red y sin diferencias considerables entre las tasas bajo cubierta y a campo abierto, superando ésta a aquella en el periodo 2002-2007.

Por lo que respecta al **magnesio**, se advierte un comportamiento similar: máximo muy marcado en 2003, con valores a campo abierto muy superiores, y estabilización posterior de la serie por debajo del umbral de 2 kg/ha y tasas en general superiores –aunque ligeramente- bajo cubierta.

El **sodio**, elemento procedente en gran parte del aporte de sal marina, presenta en general valores inferiores a la media de la Red, y habitualmente superiores en el exterior de la cubierta arbórea; con un máximo muy marcado en torno a 2003 y una reducción más o menos sostenida desde ese punto hacia el final de la serie.

El **amonio** presenta también un máximo bajo cubierta en 2004, cuando se han superado incluso los valores medios de la red, para estabilizarse a continuación y experimentar un ligero incremento en los últimos años, siempre por debajo de los 5 kg/ha. Habitualmente se han registrado deposiciones mayores a cielo abierto que en trascolación, con la excepción anteriormente mencionada.

Por lo que respecta al **cloro**, muy influenciado también por la influencia de la sal marina, y al igual que en el caso anterior, se han registrado nuevamente tasas mayores a cielo abierto y una mayor concentración de valores en el periodo 2003-2007, momento a partir del cual la serie experimenta una reducción sostenida.

Las tasas de deposición de **nitratos** son en general inferiores a la media de la Red, aunque en momentos puntuales se haya sobrepasado ligeramente la tasa obtenida a cielo abierto, como en 2003 y 2011. Las diferencias obtenidas entre las dos vías de entrada al sistema son en todo caso muy tenues, lo que indicaría una menor incidencia de la deposición seca.

Por último, y en referencia a los **sulfatos**, se observa un comportamiento muy similar: máximos locales en 2002-2004 y posterior atenuación de la serie, que experimenta un ligero repunte en 2011, y depósitos algo más pequeños bajo cubierta arbórea.

Por lo que se refiere a la distribución estacional de las precipitaciones, los mayores aportes se han producido en otoño y primavera. Cabe mencionar también que el hecho de encontrarnos en una parcela

poblada por caducifolias, que se encuentra sin hojas más de la mitad del año, disminuiría los efectos de la trascolación; mucho más patente en masas de perennifolias.

6. Calidad del aire. Inmisión.

Además del aporte de un determinado componente al ecosistema forestal, vía deposición seca/húmeda evaluada en el apartado anterior, en la Red Europea de Nivel II se mide desde 2000 la concentración en el aire de determinados contaminantes, lo que se conoce con el nombre de inmisión. Normativamente y en España se analiza la concentración de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amonio (expresados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y ozono (expresado en ppb).

La medición se hace a través de dosímetros pasivos, dispositivos de muestreo dotados de un compuesto químico diana sensible a los distintos contaminantes con los que va reaccionando y que permite evaluar la concentración en aire de los mismos. En el periodo 2000-2009 el cambio de dispositivos fue quincenal, efectuándose de forma mensual a partir de 2010.

Los principales resultados habidos en la parcela se especifican a continuación.

TABLA 20: Inmisión atmosférica. Concentraciones medias anuales de los distintos contaminantes en la parcela y media de la Red.

Año	Parcela				Media Red			
	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ (ppb)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ (ppb)
2000	4,05	2,35	1,94	34,28	2,45	2,91	2,49	34,34
2001	3,75	1,93	1,10	42,16	3,01	2,51	2,13	38,48
2002	1,55	0,75	0,83	34,59	0,95	0,75	1,57	32,70
2003	1,19	0,66	2,34	32,56	1,05	1,07	2,87	30,03
2004	1,68	1,25	4,30	28,87	1,47	1,34	2,69	25,36
2005								
2006	1,25	0,65	1,19	31,12	1,41	1,27	1,12	27,74
2007	1,69	0,88	0,95	28,66	1,49	1,45	1,44	27,36
2008	0,61	0,56	0,71	28,34	0,82	1,32	0,93	27,18
2009		1,17	0,79		1,06	2,89	1,30	36,30
2010	0,76	1,09	0,72	40,16	1,29	3,38	1,00	37,54
2011	0,82				1,50		0,48	
2012	1,19	1,67	0,63	45,97	1,60	3,25	0,85	38,79
2014	0,94	1,73	0,82	32,03	1,44	3,35	1,11	29,51
Media	1,62	1,22	1,36	34,43	1,50	2,13	1,54	32,11




FIG 18: Variación temporal de inmisión por dosímetros

Como puede verse en las gráficas anteriores, los valores de inmisión en la parcela 33Qpe han resultado superiores a los de la media de la red en óxidos de nitrógeno y amoníaco a lo largo del primer periodo, para experimentar un incremento los óxidos de nitrógeno en los dos últimos años, reduciéndose el máximo de ozono observado en 2012.

7. Análisis foliar.

El objetivo del análisis foliar es, en concordancia con las especificaciones de las redes europeas, estimar el estado nutricional del arbolado y el impacto de los contaminantes atmosféricos en los ecosistemas forestales; así como la detección de tendencias temporales y sus patrones geográficos de distribución y con ello contribuir al conocimiento y cuantificación del estado de los bosques en Europa.

7.1. Análisis Macronutrientes.

Los macronutrientes analizados han registrado los siguientes valores:

TABLA 21: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 100 hojas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
1995-1996	33 Qpe	Palencia	19,00	27,14	1,90	1,44	8,98	1,45	10,42	
	<i>Q. petraea</i>	España	19,00	27,14	1,90	1,44	8,98	1,45	10,42	
1997-1998	33 Qpe	Palencia	19,00	22,84	1,61	1,58	12,12	1,35	13,95	
	<i>Q. petraea</i>	España	19,00	22,84	1,61	1,58	12,12	1,35	13,95	
1999-2000	33 Qpe	Palencia	21,00	24,22	1,68	1,56	9,50	1,69	9,35	
	<i>Q. petraea</i>	España	21,00	24,22	1,68	1,56	9,50	1,69	9,35	
2001-2002	33 Qpe	Palencia	24,00	25,30	1,70	1,77	8,82	1,81	12,81	
	<i>Q. petraea</i>	España	24,00	25,30	1,70	1,77	8,82	1,81	12,81	
2003-2004	33 Qpe	Palencia	22,00	23,43	1,67	1,53	8,11	1,63	10,70	
	<i>Q. petraea</i>	España	22,00	23,43	1,67	1,53	8,11	1,63	10,70	
2005-2006	33 Qpe	Palencia	20,00	23,19	1,61	1,37	9,67	1,50	10,71	

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 100 hojas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
	<i>Q. petraea</i>	España	20,00	23,19	1,61	1,37	9,67	1,50	10,71	
2007-2008	33 Qpe	Palencia	28,00	25,88	1,69	1,54	12,12	1,89	10,36	
	<i>Q. petraea</i>	España	28,00	25,88	1,69	1,54	12,12	1,89	10,36	
2009-2010	33 Qpe	Palencia	17,00	26,75	1,68	1,56	10,20	1,82	11,66	
	<i>Q. petraea</i>	España	17,00	26,75	1,68	1,56	10,20	1,82	11,66	
2011-2012	33 Qpe	Palencia	21,25	24,84	1,69	1,54	9,94	1,64	11,25	
	<i>Q. petraea</i>	España	21,25	24,84	1,69	1,54	9,94	1,64	11,25	




FIG 19: Evolución de macronutrientes (mg/g eje izquierdo) y peso de acículas (g eje derecho) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas.

7.2. Análisis Micronutrientes.

TABLA 22: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	MICRONUTRIENTES (µg/g MS)				
			Na	Zn	Mn	Fe	Cu
1995-1996	33 Qpe	Palencia		23,00	4885,00	119,00	
	<i>Q. petraea</i>	España		23,00	4885,00	119,00	
1997-1998	33 Qpe	Palencia	56,00	25,00	2317,00	98,00	

Año	Parcela	Provincia	MICRONUTRIENTES (µg/g MS)				
			Na	Zn	Mn	Fe	Cu
	<i>Q. petraea</i>	España	56,00	25,00	2317,00	98,00	




FIG 20: Evolución de micronutrientes (µg/g) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas

7.3. Interpretación de resultados.

Por lo que respecta a los análisis foliares efectuados en la parcela, cabe concluir:

En primer lugar hay que tener en cuenta que en la parcela 33Qpe no se realizó el análisis foliar en 2013-2014.

La parcela 33Qpe es la única con especie dominante *Quercus petraea*, por eso en este apartado no se han realizado valoraciones para la media de la especie, sólo se refieren a los resultados obtenidos del análisis de las distintas muestras foliares:

Tras valores bastante homogéneos de **peso** en g/100 hojas se alcanza un máximo en 2007-2008 (28 g/100 hojas) que desciende al mínimo de la serie temporal en 2009-2010 (17 g/100 hojas). Esta situación puede obedecer a un momento de buena disponibilidad de agua seguida por un año de sequía que hace que el mismo número de hojas tengan menos peso.

Respecto a los macronutrientes; se han obtenido valores de **nitrógeno** en las hojas con ciertas fluctuaciones pero bastante homogéneos en el tiempo, oscilan entre 22,84 mg/g en 1997-1998 hasta 27,14 mg/g en 1995-1996. El **azufre** tiene un valor muy alto en 1995 (1,90 mg/g) que en mediciones posteriores se ha mantenido estable en torno a 1,65 mg/g. El **fósforo** no ha experimentado grandes variaciones en toda la serie por lo que podemos decir que su presencia en hojas se ha mantenido estabilizada. La presencia de **calcio** ha experimentado dos máximos de valores idénticos (12,12 mg/g) en 1997-1998 y 2007-2008 pero aparte de eso no hay ninguna tendencia como sí que ocurre con el **magnesio** cuyo contenido en hojas muestra una tendencia absoluta ascendente. En cuanto al **potasio**, se aprecian ciertas fluctuaciones entre las mediciones de 1995 a 2002 pero posteriormente los valores se han estabilizado en torno a 11 mg/g MS.

Los micronutrientes sólo se han analizado en los muestreos de 1995-1996 y 1997-1998 y no siempre se han evaluado todos ellos: cobre no se ha medido en ninguno y sodio sólo en el muestreo de 1997-1998 mientras que zinc, manganeso y hierro se han medido en ambos muestreos. Esta situación conlleva que no se pueda abordar la valoración de la evolución temporal de los nutrientes en hojas. Lo que sí podemos confirmar es un descenso en el contenido de hierro y especialmente manganeso que casi cayó a la mitad en 1997-1998, sin embargo el contenido de zinc aumento ligeramente.

8. Desfronde.

Con periodicidad mensual se ha recogido el desfronde o litterfall en la parcela mediante captadores normalizados que recogen la caída correspondiente a 1 m² de superficie. La muestra así tomada se divide en sus principales componentes (hojas, ramillas de diámetro inferior a 2 cm y otras, que incluyen frutos, líquenes, musgos,...) y se analiza en el laboratorio.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos desde 2005; haciéndose la salvedad al igual que en casos anteriores, de que en 2012 se ha muestreado el periodo enero-julio, mientras que en 2014 los análisis corresponden al periodo mayo-diciembre.

TABLA 23: Resultados medios del análisis de desfronde en sus distintas fracciones. Aporte anual en kg/ha; porcentaje de carbono y contenido en mg/g de materia seca de nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, magnesio y potasio.

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
2005	Hojas	2.726	51,40	14,21	1,01	0,79	8,10	1,44	4,41
	Ramillas	405	51,46	7,31	0,11	0,38	5,04	0,57	2,49
	Otras	668	50,11	15,59	0,91	1,00	7,00	0,99	3,56
2006	Hojas	3.061	51,04	17,20	1,30	1,28	7,57	1,60	6,87
	Ramillas	667	51,92	6,71	0,50	0,41	5,46	0,57	2,13
	Otras	744	50,91	11,43	0,91	0,74	9,37	0,80	3,04
2007	Hojas	3.174	53,16	18,10	1,27	1,09	7,72	2,52	4,35
	Ramillas	332	53,45	6,42	0,43	0,36	4,36	1,81	1,62
	Otras	822	52,42	13,56	1,00	0,83	7,28	2,50	2,58
2008	Hojas	3.572	52,32	22,71	1,38	1,47	8,47	1,62	6,35
	Ramillas	547	51,96	6,47	0,51	0,37	5,54	0,54	1,92
	Otras	557	51,19	15,81	1,05	1,11	12,00	1,14	3,25
2009	Hojas	2.943	51,50	14,36	1,14	0,73	6,36	1,37	4,67
	Ramillas	761	51,80	4,43	0,47	0,30	4,68	0,45	1,67
	Otras	873	51,27	11,43	1,13	0,86	8,30	0,78	3,57
2010	Hojas	2.912	53,64	18,33	1,58	0,73	6,40	1,13	4,97
	Ramillas	1.957	53,04	6,88	0,62	0,34	4,69	0,48	1,66
	Otras	1.624	52,48	12,62	1,11	0,58	8,10	0,70	2,19
2011	Hojas	3.087	52,06	19,46	1,40	1,13	7,00	2,45	4,84

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
	Ramillas	957	52,06	6,28	0,46	0,36	4,48	1,40	1,62
	Otras	872	51,19	13,40	1,02	0,86	7,69	2,63	2,64
2012	Hojas	167	52,00	22,76	1,64	1,26	6,24	1,57	5,82
	Ramillas	1.226	52,23	5,94	0,56	0,33	4,71	0,77	1,33
	Otras	635	52,34	13,32	1,11	0,85	9,38	1,37	1,59
2014	Hojas	3.151	50,51	17,76	1,01	0,85	6,99	1,35	5,09
	Ramillas	1.105							
	Otras	581							
Media	Hojas	2.755	51,96	18,32	1,30	1,04	7,21	1,67	5,26
	Ramillas	884	52,24	6,31	0,46	0,36	4,87	0,83	1,80
	Otras	820	51,49	13,39	1,03	0,85	8,64	1,36	2,80




FIG 21: Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica

Puede verse, con carácter general, cómo el desfronde foliar es considerablemente elevado, posiblemente debido al carácter caducifolio de la masa y que la fracción de ramillas de diámetro inferior a 2 cm alcanza también una proporción considerable, contrariamente a lo que sucede en otras especies. Las bajas tasas observadas en 2012 se deberían a no haber muestreado el otoño de ese año, momento en el que se incorpora la mayoría del litter. El contenido medio en C del desfronde obtenido se situaría ligeramente por encima del 50%.

9. Fenología.

La fenología estudia la relación entre los fenómenos climáticos y las características morfológicas del desarrollo anual de los vegetales. Tras las observaciones de series anuales suficientemente representativas, puede obtenerse una valiosa información sobre la respuesta de la vegetación frente a variaciones climáticas, acrecentar el papel de las especies forestales como bioindicadoras y explicar el estado actual de la vegetación. El conocimiento de las fases fenológicas del arbolado es también una importante herramienta de gestión fitosanitaria de las masas forestales, pues el ciclo biológico y la capacidad de daño de buena parte de las plagas forestales van ligadas al desarrollo de una determinada fase, particularmente en el caso de los insectos defoliadores. Los cambios fenológicos en la vegetación juegan además un importante papel en la modelación del paisaje.

La evaluación fenológica se hace sobre 20 árboles de la parcela, seleccionando de entre aquellos de las clases dominante o codominante y preferentemente con buena visibilidad de copa; siempre desde una posición fija para evitar sesgos de observación; quincenalmente desde 1999 hasta 2010 y de forma mensual a partir de entonces.

La evaluación de las distintas fases fenológicas ha experimentado sucesivos cambios metodológicos a lo largo de la serie histórica de estudio, resultando de entre ellas, las más significativas y coherentes la aparición de hoja y la floración; siempre haciendo la salvedad de que se ha considerado que una fase comenzaba cuando lo hacía el 50% de la población muestra.

Se presentan a continuación y para las fases mencionadas, los valores históricos obtenidos en la parcela 33Qpe, de entre ellos el comienzo y fin de fase; su duración o amplitud; el número de días transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de inicio de la fase, y –como esbozo de la influencia de la temperatura en el fenómeno- los días-grado transcurridos desde el 1 de enero (periodo de parada vegetativa) y el comienzo de la fase, obtenido de la estación meteorológica instalada en la parcela.

TABLA 24: Resultados de la evaluación fenológica. Comienzo, final y amplitud de la fase. Días desde el 1 de enero hasta el comienzo de fase. Temperatura acumulada (grados-día) hasta el inicio de fase.

Año	Aparición Hoja/Acícula ≥ 50% Población					Floración ≥ 50% Población				
	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°C día)
1999	28/04/99	07/07/99	70	117	500					
2000	16/05/00	15/06/00	30	136	705					
2001	15/05/01	17/07/01	63	134	661					
2002	15/05/02	17/07/02	63	134	689					
2003	21/05/03	04/06/03	14	140	720					
2004	27/04/04	19/05/04	15	117	423	29/06/04	13/07/04	14	180	1180
2005	11/05/05	02/06/05	22	130	500	02/06/05	15/06/05	13	152	761
2006	02/05/06	16/05/06	14	121	453					
2007	05/05/07	30/05/07	25	124	600	30/05/07	14/06/07	15	149	790
2008	07/05/08	02/07/08	56	127	692	18/06/08	15/07/08	27	169	1074
2009	05/05/09	19/05/09	14	124	499	07/07/09	21/07/09	14	187	907
2010	11/05/10	25/05/10	14	130	424	25/05/10	15/06/10	21	144	568
2011	26/04/11	25/05/11	29	115	448	25/05/11	29/06/11	35	144	695
2012	25/04/12	30/05/12	35	115	493	30/05/12	27/06/12	28	150	845
2014	23/04/14	28/05/14	35	112	687	28/05/14	25/06/14	28	147	1048
Media			33	125	566			22	158	874




FIG 22: Fases fenológicas. Días desde 1 de enero hasta comienzo de fase.

Como puede verse en los gráficos anteriores, la brotación es en general anterior a la aparición de la flor, estructura que por otra parte y para el roble se mantiene poco tiempo en el árbol; produciéndose la primera en torno a abril y la segunda alrededor de mayo.



FIG 23: Brotación hoja nueva y aparición y elongación de los amentos masculinos (mayo).

10. Cintas diamétricas.

Como se ha indicado anteriormente, las parcelas van dotadas de dendrómetros en continuo, 5 instalados en 1999 ampliados a 15 en 2010, de quienes se ha tomado la medida de forma quincenal hasta 2009 y mensualmente a partir de 2010.

Para cada una de las cintas instaladas y año de observación se ha obtenido el crecimiento medio, mediante diferencia entre los valores máximos y mínimos anuales –expresado en datos absolutos y en porcentaje sobre el diámetro mínimo- junto con la oscilación o diferencia entre el diámetro en enero y diciembre de cada año, en idénticos términos que el parámetro anterior; y que no tiene necesariamente que coincidir, debido a movimientos de expansión y contracción del tronco ligados al flujo o parón de la savia.

TABLA 25: Valor medio dendrómetros. Crecimiento medio: diferencia en cm y porcentaje entre el máximo y mínimo del año. Oscilación media: diferencia y porcentaje entre los valores de enero y diciembre (o comienzo/fin de año en años incompletos)

AÑO	Crecimiento medio (cm)	Crecimiento medio (%)	Oscilación media (cm)	Oscilación media (%)
1999	0,01	0,06	0,01	0,00
2000	0,15	1,09	0,15	1,02
2001	0,19	1,41	0,19	1,30
2002	0,17	1,21	0,17	1,08
2003				
2004	0,18	1,23	0,18	0,95
2005	0,21	1,43	0,21	1,06
2006	0,26	1,75	0,26	1,40
2007	0,18	1,22	0,18	0,99
2008	0,10	0,69	0,10	0,61
2009	0,10	0,67	0,10	0,67
2010	0,22	1,05	0,22	0,52
2011	0,16	0,79	0,16	0,60
2012	0,14	0,68	0,14	0,60
2014	0,12	0,58	0,12	0,57
Media	0,16	0,99	0,16	0,81




FIG 24: Crecimiento diametral anual. Porcentaje sobre el inicio.

Como puede verse en el gráfico anterior, el crecimiento diamétrico anual en la parcela considerada ha oscilado, excepción hecha del primer año de evaluación, entre el 0,69% de 2008 y el 1,75% de 2006, situándose por regla general en valores próximos al 1% anual.