


DD

LABIATAE

Nepeta hispanica Boiss. & Reut. **subsp. *hispanica***

Datos generales

Altitud: 150-1.100 m
 Hábitat: Zonas secas, sobre suelos básicos, calizos y yesosos
 Fitosociología: No se conoce
 Biotipo: Caméfito
 Biología reproductiva: Dioica
 Floración: No se conoce con exactitud (V-VII)
 Fructificación: No se conoce con exactitud (V-VIII)
 Expresión sexual: Unisexual dioica
 Polinización: Entomófila
 Dispersión: Desconocido
 Nº cromosómico: No conocido
 Reproducción asexual: No



A. Cadete. © Universidad de Sevilla

Ficha Roja

Categoría UICN para España: DD
 Categoría UICN mundial: Ídem
 Figuras legales de protección: No existen

Corología

UTM 1x1 visitadas:	0
UTM 1x1 confirmadas:	0
Poblaciones confirmadas:	0
Poblaciones nuevas:	0
Poblaciones extintas:	0
Poblaciones restituidas:	0
Poblaciones no confirmadas:	1
Poblaciones no visitadas:	1
Poblaciones descartadas:	0

Identificación

Planta perenne, tomentosa, dioica, sin glándulas sentadas. Tallos 20-50 cm, ramificados, cuadrangulares. Hojas ovado-elípticas, opuestas, crenadas, pecioladas. Inflorescencia laxa, tirsoidea, con dicasios paucifloros. Flores unisexuales, zigomorfas; corola 5-7 mm, bilabiada, blanca o rosada. Fruto tetranúcula; núculas lisas.

El grupo al que pertenece se encuentra en revisión, existiendo indicios de que los taxones de la sección *Oxynepea* presentes en el territorio peninsular, como *N. beltranii* Pau, en realidad pertenezcan a una misma especie.

Distribución y hábitat

La localidad clásica de la especie corresponde a María (Almería), aunque durante la primera década del siglo pasado Reverchon la herborizó en varias localidades de las Sierras de Cazorla-Segura (Jaén). Su presencia en la provincia de Almería es bastante dudosa; cabe la posibilidad de que se trate de una confusión con otra localidad de las Serranías de Cazorla y Segura (Jaén) también llamada María. Por último, si como se ha dicho, otros taxones de la sección *Oxynepea* son sinónimos, se extendería también por Madrid, y puntos aislados de la submeseta norte y del valle del Ebro.

Vive en claros de pinar y pies de cantiles rocosos, sobre calizas o yesos.

Taxón que fue herborizado por Bourgeau en 1851 en María (Almería). Desde entonces no se ha vuelto a ver en la localidad clásica, aunque existen dudas sobre la verdadera procedencia del material. Se precisa una revisión taxonómica detallada que aclare su relación con otras especies ibéricas. En la actualidad no se encuentra protegido de forma legal.

Biología y demografía

No se conocen.

Amenazas y conservación

Las amenazas son desconocidas. Es probable que la profunda transformación agrícola que han sufrido determinadas zonas donde había sido citada (cambio tanto en el tipo de explotación agrícola como en las especies cultivadas) haya provocado su desaparición o que se encuentre muy reducida en sus poblaciones.

Se desconoce si sus posibles áreas de distribución se encuentran dentro del ámbito de los P. Naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de María-Los Vélez (poblaciones andaluzas).

Se necesita un trabajo de campo de prospección sistemática del área andaluza para tratar de localizar poblaciones, si aún existen. En caso negativo se podría plantear un posible cultivo de las núculas existentes en los pliegos de herbario, si aún son viables, con vistas a una posible reintroducción de este taxón.

Referencias: UBERA & VALDÉS (1983). Autores: M. CUETO ROMERO y C. AEDO.