




© RICARDO G. CALMAESTRA

Buteo buteo

Buteo buteo (Busardo ratonero). Una de las rapaces diurnas más abundante y ampliamente distribuida por toda Europa. Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, donde es más abundante en la mitad norte y menos en las áreas costeras mediterráneas. Prefiere biotopos donde se alternan masas forestales con espacios abiertos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11,4°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 247 mm y 1949 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL



■ PRESENCIA
■ ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,4476

SITUACIÓN FUTURA

■ ECHAM4
■ CGCM2
■ CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie de 67% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de 31% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	386300 (77%)	% Protegido actualmente:	(56%)
Área potencial:	380300	% Protegido futuro:	(21%)


APF OPF

CGCM2	A2		B2	
	APF	OPF	APF	OPF
2011-2040	302400 (-20%)	286500 (-25%)	(70%)	(67%)
2041-2070	244200 (-36%)	263100 (-31%)	(58%)	(62%)
2071-2100	171800 (-55%)	234900 (-38%)	(42%)	(56%)
ECHAM4	2011-2040	141600 (-63%)	138200 (-64%)	(35%) (34%)
	2041-2070	125300 (-67%)	125500 (-67%)	(31%) (31%)
	2071-2100	108100 (-72%)	114000 (-70%)	(27%) (29%)

(Busardo ratonero)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.