



Foto: M. Cueto


Centaurea kunkelii

Es un endemismo de la Sierra de Gádor (Almería) con sola dos poblaciones descritas. Se desarrolla en bordes de caminos y taludes próximos, aunque se puede encontrar de forma dispersa entre el matorral adyacente. En las poblaciones muestreadas se han detectado, hasta el momento, un número de individuos inferior a 2000. La superficie de ocupación real es inferior a 4 km².

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

La principal amenaza para las poblaciones en estos momentos la constituye el plan de mejora de las vías de comunicación. El riesgo de extinción es muy elevado por lo que debe conservarse ex situ.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 5 (8%)
- área potencial: 866

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	310 (36%)	189 (22%)	40%	40%
• 2041-2070	0 (0%)	12 (1%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	1193 (138%)	3414 (394%)	100%	100%
• 2041-2070	399 (46%)	882 (102%)	20%	100%
• 2071-2100	27 (3%)	576 (66%)	0%	20%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.