



© MARIO G. PARÍS

# Discoglossus jeanneae

**Discoglossus jeanneae (Sapillo pintojo meridional).** Restringido a la Península Ibérica, de donde es endémico. Está presente en el sur peninsular y en la parte oriental de la submeseta norte. Prefiere medios abiertos y utiliza pequeños humedales y encharcamientos más o menos permanentes para reproducirse. Existen citas desde el nivel del mar hasta más de 2000 m, en Sierra Nevada. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4.8°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 284 mm y 1230 mm al año.


# (Sapillo pintojo meridional)

ESTATUS ACTUAL

NT

## SITUACIÓN ACTUAL

## SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA  
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,4472

- ECHAM4
- CGCM2
- CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 18% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 39% y un 48% en 2041-2070.


## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	46700	(9%)	% Protegido actualmente:	(6%)
Área potencial:	234600		% Protegido futuro:	(3%)

### APF                      OPF

CGCM2	A2		B2	
	APF	OPF	APF	OPF
2011-2040	182900 (-22%)	141000 (-40%)	(52%)	(40%)
2041-2070	158100 (-33%)	177700 (-24%)	(49%)	(54%)
2071-2100	147100 (-37%)	170900 (-27%)	(46%)	(53%)
ECHAM4	2011-2040	135500 (-42%)	127200 (-46%)	(40%) (38%)
	2041-2070	182700 (-22%)	193100 (-18%)	(39%) (48%)
	2071-2100	247300 (5%)	241000 (3%)	(54%) (54%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.