



Foto: X.R. García


## *Eryngium duriaei* subsp. *juresianum*

Es un endemismo del Noroeste peninsular, presente en la Serra do Xurés y de Santa Eufemia y Montes do Invernadeiro (Ourense), Serra do Candán (Pontevedra) y Montes do Pindo (A Coruña). Aunque puede adentrarse en el sotobosque de robledales prefiere suelos despejados por lo que coloniza las cunetas de pistas forestales de montaña y áreas recién quemadas.

### SITUACIÓN ACTUAL



### SITUACIÓN FUTURA



#### Evolución prevista

Sin especiales amenazas en la actualidad tampoco se prevén problemas por cuestiones climáticas en el futuro.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 24 (2%)
- área potencial: 1151

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	7980 (691%)	3111 (269%)	79%	71%
• 2041-2070	11977 (1037%)	4710 (408%)	79%	83%
• 2071-2100	1047 (91%)	3114 (270%)	21%	75%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	10389 (899%)	2248 (195%)	54%	17%
• 2041-2070	10271 (889%)	3230 (280%)	46%	17%
• 2071-2100	469 (41%)	974 (84%)	8%	8%

### VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.