



Foto: M.I. Romero


Eryngium viviparum

Es un endemismo atlántico que en España se encuentra principalmente en Galicia, en el interior de la provincia de Lugo y Ourense. El contingente ibérico de la especie está muy fragmentado por alteración y pérdida del hábitat y ha desaparecido de localidades conocidas de antiguo. Se desarrolla en llanuras y depresiones arcillosas sometidas a encharcamiento temporal bajo clima atlántico.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

Su mayor problema es la especificidad del hábitat, que hace que la zona potencial lo sea sólo climáticamente pero no real y adaptada a sus necesidades. Su futuro climático es incierto ya que las áreas potenciales futuras no se superponen con las áreas ocupadas actualmente hacia final de siglo. Por ese motivo se hace necesario un plan de vigilancia y refuerzo de sus poblaciones y su conservación ex situ.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 23 (0%)
- área potencial: 7085

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	10124 (143%)	8939 (126%)	78%	78%
• 2041-2070	5142 (73%)	8027 (113%)	70%	70%
• 2071-2100	258 (4%)	266 (4%)	0%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	1716 (24%)	3347 (47%)	0%	0%
• 2041-2070	323 (5%)	2407 (34%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	468 (7%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.