



© RICARDO G. CALMAESTRA

Falco tinnunculus

(Cernícalo vulgar)

ESTATUS ACTUAL


NO EVALUADO

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar). Distribución europea muy amplia, por todo el continente. Está presente, asimismo, en la totalidad del territorio peninsular. Ocupa en gran medida áreas agrícolas tradicionales, si bien está presente en una amplia variedad de biotopos, como cortados rocosos, acantilados marinos, pueblos y bosques abiertos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4



TSS: 0,4303

Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie de un 13% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de 91% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	457700 (91%)	% Protegido actualmente:	(61%)
Área potencial:	402100	% Protegido futuro:	(67%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	448000 (11%)	459200 (14%)	(90%)	(92%)
2041-2070	442400 (10%)	446800 (11%)	(88%)	(89%)
2071-2100	438700 (9%)	438100 (9%)	(88%)	(88%)
ECHAM4				
2011-2040	448500 (12%)	443100 (10%)	(90%)	(89%)
2041-2070	454800 (13%)	456300 (13%)	(91%)	(91%)
2071-2100	447200 (11%)	455400 (13%)	(89%)	(91%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.