



© JAVIER MILLA

# Galerida cristata

# (Cogujada común)

ESTATUS ACTUAL


NO EVALUADA

**Galerida cristata (Cogujada común).** Distribución continua por todas las zonas templadas y cálidas de Europa, también en latitudes meridionales. En la Península Ibérica está presente de modo continuo en toda la región mediterránea, faltando en zonas montañosas. Ocupa medios abiertos, preferentemente cultivos cerealistas y pastos, aunque también aparece en cultivos arbóreos como olivares. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,3°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

## SITUACIÓN ACTUAL

## SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4



TSS: 0,6692

### Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 15% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de 98% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	387600 (77%)	% Protegido actualmente:	(56%)
Área potencial:	384900	% Protegido futuro:	(60%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	394500 (2%)	394600 (3%)	(93%)	(93%)
2041-2070	412800 (7%)	403800 (5%)	(96%)	(95%)
2071-2100	429000 (11%)	409000 (6%)	(98%)	(96%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	437000 (14%)	433500 (13%)	(98%)	(98%)
2041-2070	447500 (16%)	441200 (15%)	(98%)	(98%)
2071-2100	457200 (19%)	442700 (15%)	(99%)	(98%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.