



© FERNANDO ROMÃO

# Malpolon monspessulanus


**Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda).** De distribución circummediterránea, está presente en prácticamente toda la Península Ibérica, con la excepción de la fachada cantábrica. Podemos encontrarla desde el nivel del mar hasta los 2160 m, prefiriendo zonas de matorral y espacios abiertos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9.7°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1802 mm anuales.

# (Culebra bastarda)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,3679

## SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 19% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 47% y un 50% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	238300 (47%)	% Protegido actualmente:	(33%)
Área potencial:	317500	% Protegido futuro:	(19%)

### APF


### OPF

CGCM2	A2		B2	
	2011-2040	2041-2070	2011-2040	2041-2070
	252800 (-20%)	241100 (-24%)	(61%)	(59%)
	250500 (-21%)	270000 (-15%)	(55%)	(61%)
	186400 (-41%)	260400 (-18%)	(37%)	(58%)
ECHAM4				
	295200 (-7%)	331900 (5%)	(62%)	(69%)
	246500 (-22%)	257800 (-19%)	(47%)	(50%)
	209000 (-34%)	282600 (-11%)	(41%)	(56%)


## A2




## B2





2011-2040



2041-2070



2071-2100



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.