



© RICARDO G. CALMAESTRA

Motacilla cinerea


Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña). En Europa ocupa toda la cuenca mediterránea, el centro y el oeste del continente. Su distribución es amplia en la Península Ibérica, especialmente en la franja septentrional. En la España mediterránea está vinculada a zonas montañosas. Es una especie dependiente de cursos de agua, en especial tramos altos y medios. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 242 mm y 1949 mm anuales.

(Lavandera cascadeña)

ESTATUS ACTUAL


NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,5197

SITUACIÓN FUTURA



Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 64% y un 69% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 36% y un 40% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	238300 (47%)	% Protegido actualmente:	(37%)
Área potencial:	297600	% Protegido futuro:	(15%)

APF


OPF

	APF		OPF	
CGCM2	A2	B2	A2	B2
2011-2040	239600 (-19%)	232500 (-22%)	(72%)	(71%)
2041-2070	166900 (-44%)	202300 (-32%)	(58%)	(66%)
2071-2100	131200 (-56%)	184700 (-38%)	(47%)	(62%)
ECHAM4				
2011-2040	121400 (-59%)	119500 (-60%)	(45%)	(45%)
2041-2070	93600 (-69%)	106000 (-64%)	(36%)	(40%)
2071-2100	89600 (-70%)	99800 (-66%)	(34%)	(38%)



A2





B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.