



© RICARDO G. CALMAESTRA

# Muscicapa striata


**Muscicapa striata (Papamoscas gris).** Se distribuye ampliamente por toda Europa. En la Península Ibérica se encuentra de manera continua en la franja mediterránea y en la campiña cantábrica arbolada, y de manera puntual por gran parte del territorio. Selecciona biotopos con arbolado poco denso, como bordes forestales, sotos y cultivos arbóreos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1873 mm anuales.

# (Papamoscas gris)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,3608

## SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 38% y un 40% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 82% y un 83% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	199700 (40%)	% Protegido actualmente:	(28%)
Área potencial:	305700	% Protegido futuro:	(27%)

### APF


### OPF

	APF		OPF	
CGCM2	A2	B2	A2	B2
2011-2040	358900 (17%)	369100 (21%)	(77%)	(80%)
2041-2070	357000 (17%)	371300 (21%)	(77%)	(79%)
2071-2100	374800 (23%)	365700 (20%)	(76%)	(78%)
ECHAM4				
2011-2040	378500 (24%)	391700 (28%)	(77%)	(80%)
2041-2070	427700 (40%)	422200 (38%)	(82%)	(83%)
2071-2100	445600 (46%)	445500 (46%)	(86%)	(87%)

## A2




## B2




2011-2040

## A2




## B2




2041-2070

## A2



## B2



2071-2100

### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.