



© RICARDO G. CALMAESTRA

Passer domesticus


Passer domesticus (Gorrión común). Extendido por toda Europa. Se encuentra ampliamente distribuido por todo el territorio de la Península Ibérica. El Gorrión común se encuentra muy vinculado a pueblos, ciudades y a todo tipo de paisajes de origen humano. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11.4°C y 36.7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

(Gorrión común)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,4872

SITUACIÓN FUTURA



Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie de un 6% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de un 100% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	492200 (98%)	% Protegido actualmente:	(75%)
Área potencial:	473000	% Protegido futuro:	(79%)


APF OPF

CGCM2	A2		B2		OPF	
	Área (km²)	%	Área (km²)	%	Área (km²)	%
2011-2040	488200	(3%)	484100	(2%)	(97%)	(97%)
2041-2070	500100	(6%)	495100	(5%)	(100%)	(99%)
2071-2100	499600	(6%)	497800	(5%)	(99%)	(99%)
ECHAM4						
2011-2040	503200	(6%)	503200	(6%)	(100%)	(100%)
2041-2070	503300	(6%)	503300	(6%)	(100%)	(100%)
2071-2100	502700	(6%)	503300	(6%)	(100%)	(100%)


A2




B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.