



© FERNANDO ROMÃO

# Pelodytes punctatus

# (Sapillo moteado común)


ESTATUS ACTUAL

LC

**Pelodytes punctatus (Sapillo moteado común).** Se distribuye por el sudoeste de Europa. En la Península Ibérica ocupa gran parte de la mitad oriental y suroccidental, aunque de manera discontinua. Para reproducirse ocupa gran variedad de ambientes acuáticos, estacionales y permanentes. Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los 1300 m de altitud, habiendo sido citado hasta los 1630 m. El rango de temperaturas de su distribución varía entre -6°C y 35°C, y el rango de precipitaciones entre 270 mm y 1230 al año. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9.7°C y 35.2°C, y el de precipitaciones entre 272 mm y 1230 mm al año.

## SITUACIÓN ACTUAL

## SITUACIÓN FUTURA



■ PRESENCIA  
■ ÁREA POTENCIAL

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos elevados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 96% y un 99% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 1% y un 4% en 2041-2070.

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4


TSS: 0,5477

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	80800 (16%)	% Protegido actualmente:	(12%)
Área potencial:	228100	% Protegido futuro:	(0%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	182800 (-20%)	189700 (-17%)	(71%)	(71%)
2041-2070	93700 (-59%)	143100 (-37%)	(39%)	(56%)
2071-2100	20100 (-91%)	700(-100%)	(7%)	(0%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	59600 (-74%)	60600 (-73%)	(26%)	(26%)
2041-2070	2500 (-99%)	8800 (-96%)	(1%)	(4%)
2071-2100	0(-100%)	111200 (-51%)	(0%)	(44%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.