




Foto: Bjoertvedt (Wikimedia Commons)

## Populus tremula

El álamo temblón es de distribución septentrional en España, apareciendo escasamente en las cordilleras norteñas y puntos del Sistema Ibérico y Central. Aparece entre el nivel del mar y los 1800 m, sin especial preferencia por un rango determinado, en pendientes moderadas o bajas. Es un árbol poco exigente climáticamente que se dispersa por rebrotes, a veces a bastante distancia, formando colonias clonales.

### SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia  
■ Área potencial

### SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2  
■ ECHAM4  
■ CGCM2 y ECHAM4

#### Evolución prevista

No aparecen problemas graves aunque su pequeña extensión aconseja un seguimiento de las poblaciones de mayor interés. El área potencial es amplia y se superpone aceptablemente con la de ocupación actual.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 705 (1%)
- área potencial: 71645


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	62870 (88%)	31800 (61%)	100%	63%
• 2041-2070	48184 (67%)	16060 (31%)	53%	42%
• 2071-2100	16151 (22%)	10875 (21%)	66%	32%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	64902 (91%)	5835 (11%)	89%	68%
• 2041-2070	40178 (56%)	2430 (5%)	62%	61%
• 2071-2100	27723 (41%)	73 (0.1%)	26%	41%

### VULNERABILIDAD





A2



B2




2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Protección de espacios actuales.

No parece necesaria ninguna actuación específica.