



© RICARDO G. CALMAESTRA

Sylvia melanocephala

(Curruca cabecinegra)


ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra). En Europa, su distribución está restringida a la cuenca mediterránea. En la Península Ibérica está presente de manera continua en la mitad meridional y en toda la vertiente mediterránea. Penetra por el valle del Ebro hasta la costa cántabra y aparece en buena parte de Galicia. Está ausente de la submeseta norte y de la mayor parte de la región eurosiberiana. Muy vinculada a bosque y matorral mediterráneo. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1926 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,6571

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 56% y un 57% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial no se reduce en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	292000 (58%)	% Protegido actualmente:	(43%)
Área potencial:	321200	% Protegido futuro:	(47%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	363300 (13%)	352200 (10%)	(93%)	(92%)
2041-2070	463700 (44%)	422100 (31%)	(99%)	(97%)
2071-2100	491400 (53%)	440000 (37%)	(100%)	(98%)
ECHAM4				
2011-2040	494400 (54%)	497200 (55%)	(100%)	(100%)
2041-2070	502900 (57%)	502100 (56%)	(100%)	(100%)
2071-2100	503300 (57%)	503100 (57%)	(100%)	(100%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.