



© FRANCIS MARTÍN

Sylvia undata


Sylvia undata (Curruca rabilarga). En Europa es típicamente mediterránea, presente en su sector más occidental hasta la Península Itálica. En la Ibérica se encuentra ampliamente distribuida por las regiones de influencia mediterránea y por las zonas térmicas de la región eurosiberiana. Prefiere áreas de matorral denso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -7,9°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

(Curruca rabilarga)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,3263

SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos elevados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 68% y un 73% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 23% y un 28% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	341100 (68%)	% Protegido actualmente:	(52%)
Área potencial:	405100	% Protegido futuro:	(13%)

APF


OPF

CGCM2	A2		B2	
	APF	OPF	APF	OPF
2011-2040	340200 (-16%)	(74%)	338100 (-17%)	(74%)
2041-2070	253000 (-38%)	(56%)	299200 (-26%)	(66%)
2071-2100	157400 (-61%)	(35%)	259800 (-36%)	(58%)
ECHAM4	A2		B2	
	APF	OPF	APF	OPF
2011-2040	216400 (-47%)	(48%)	195200 (-52%)	(44%)
2041-2070	109500 (-73%)	(23%)	131300 (-68%)	(28%)
2071-2100	55100 (-86%)	(11%)	76100 (-81%)	(16%)



A2





B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.