



**RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y
CONTINUO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES**

**RED DE NIVEL II
MEMORIA – 2007**

PARCELA 45 Pr (ALAVA)

**20
07**



**DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y DESERTIFICACION
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LOS MONTES CONTRA AGENTES NOCIVOS**



Tecmena, s.l.
TECNICAS DEL MEDIO NATURAL

Clara del Rey, 22
28002 Madrid
Tel. 91 413 70 07
Fax. 91 510 20 57
tecmenasl@interlink.es

1. Situación de la parcela.

La parcela representa el pinar de *Pinus radiata* del sector Cántabro-Euskaldún de la Provincia Cantabroatlántica.

Sus principales características se resumen en la siguiente tabla:

TABLA 1: Características de la parcela.

PARCELA	ESPECIE	PROVINCIA	T. MUNICIPAL	REPLANTEO	NIVEL
45 Pr	<i>Pinus radiata</i>	Álava	Llodio	03/08/1994	II

LATITUD	LONGITUD	XUTM	YUTM	ALTITUD	PENDIENTE	ORIENTACIÓN	PARAJE
+43 ^o 08'00"	-02 ^o 59'00"	502.000	4.777.000	275	43	Norte	Larrakullo




FIG 1: Posición y vistas de la parcela 45Pr.

2. Caracterización de la parcela.

2.1. Climatología.

Las principales características de la parcela se dan en la siguiente tabla:

TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
T(°C)	5,1	6,3	8,0	9,5	12,7	15,7	18,1	18,4	17	13,2	8,4	5,9	11,5
P(mm)	132	101	65	74	63	47	24	44	50	81	112	149	940
T. Media Máximas Mes más Cálido							23,6						
1,8	T. Media Mínimas Mes más Frío												

De acuerdo a clasificación de Allué, el clima se corresponde con un VI(V) *Nemoral genuino*.

De acuerdo a la clasificación en pisos bioclimáticos, la parcela se encuentra en el *Piso Colino* de la *Región Eurosiberiana*.




FIG 2: Climodiagrama de la parcela.


2.2. Geología y Suelos.

Litología: Lutitas y areniscas.

Edafología: Stagnic Alisol, Haplic-Stagnic Alisol y Dytria Regosol.


Stagnic Alisol: Se localiza en una zona de la parcela con pendiente moderadamente escarpada. El clima húmedo se superpone a la pendiente y determina que sea tan sólo moderadamente bien drenado. El material originado procede de la alteración “in situ” de lutitas. En el suelo se distinguen tres partes: la superior, donde la materia orgánica está concentrada, a pesar de los claros indicios de una buena actividad de

la fauna , en los 3 cm superficiales ; la zona media, que sufre un claro proceso de iluviación de arcilla y la parte baja, donde las condiciones reductoras por saturación prolongada con agua, se aprecian en los colores grises y los moteados rojizos.



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
A	0-3	Pardo muy oscuro (7.5 YR 2/3) en húmedo; Limoso; estructura grumosa, débil, fina; muy friable en húmedo; abundantes raíces; muy poroso; buena actividad de la fauna; límite piano y brusco.
BA	3-20	Pardo (7.5 YR 4/6) en húmedo; limo-arenoso; estructura grumosa, mediana, fuerte; muy friable en húmedo; cutanes de arcilla, moderadamente espesos y zonales en las caras estructurales y paredes de los poros; abundantes raíces de todos los tamaños; abundantes poros medianos; buena actividad de la fauna; límite plano y gradual.
B _{t1}	20-50	Pardo (7.5 YR 4/6) en húmedo; Limoso, con algo de arena fina; estructura poliédrica subangular, muy fina, fuerte; friable en húmedo; cutanes de arcilla moderadamente espesos y continuos en las caras estructurales y paredes de los poros ; frecuentes raíces, de muy finas a medianas; abundantes poros finos (1mm); edafotubos de actividad de la fauna; límite plano y gradual.


Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
B_{12}	50-75	Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo; Limoso; estructura poliédrica angular, fina, fuerte; friable en húmedo; cutanes de arcilla moderadamente espesos y continuos en las caras estructurales y paredes de los poros; frecuentes raíces, finas-medianas; abundantes poros finos; Ligera o nula actividad de la fauna; Límite plano y gradual.
B_{tg}	>80	Verde grisáceo (7 Y 6/2) en húmedo; frecuentes manchas (20%), medianas (0.5 cm), pardo rojizas (7.5YR 5/8); Limoso; estructura poliédrica angular, media, fuerte; friable en húmedo; cutanes de arcilla moderadamente espesos y discontinuos en las caras estructurales; abundantes poros finos.



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
0	3	Buena calidad
A	0-15	Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en húmedo; limo-arcilloso; estructura poliédrica angular, gruesa, moderada; escasas gravas (10cm), angulosas, de arenisca, ferroginizadas; muy friable en húmedo; frecuentes raíces de todos los tamaños; abundantes poros finos; ligera actividad de la fauna; límite plano y gradual.


Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
B _t	15-60	Pardo (10 YR 4/6) en húmedo; limo-arcillo-arenoso; estructura poliédrica angular, fina, fuerte; fragmentos redondeados, muy gruesos, de areniscas ferroginizadas; friable-firme en húmedo; cutanes de arcilla moderadamente espesos y continuos en las caras estructurales y paredes de los poros; pocas raíces de todos los tamaños; abundantes poros finos; poca actividad de la fauna; límite piano y neto.
C	60-80	Amarillo verdoso (5 Y 6/3) en húmedo; manchas grandes (4cm), destacadas, pardo rojizas (5 YR 4/8), en húmedo; limo-arcillo-arenoso; estructura poliédrica angular, mediana, moderada; fragmentos muy grandes, redondeados, de areniscas ferroginizadas; friable en húmedo; cutanes de arcilla, moderadamente espesos y discontinuos en las caras estructurales; escasas raíces finas; abundantes poros finos; límite irregular y brusco.
R	>80	Pardo amarillo grisáceo (10 YR 6/2) en húmedo; areniscas con segregaciones rojizas de hierro.

Haplic-Stagnic Alisol: El material originario procede de lutitas, que son observables en la base del perfil. La combinación de clima húmedo y suave pendiente determinan un drenaje pobre. El solum es relativamente delgado, los primeros 25 cm muestra una buena distribución de la materia orgánica. Los 25 cm inferiores están caracterizados por una fuerte iluviación y sobretodo por pequeños moteados rojizos, que indican condiciones reductoras temporales. Tales condiciones reductoras limitan el desarrollo radicular, aunque no de manera absoluta, sobre todo a partir de los 50 cm de profundidad.



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
A	0-10	Pardo oscuro (7.5 YR 3/4) en húmedo; limo-arcilloso; estructura grumosa, mediana, fuerte; muy friable en húmedo; frecuentes raíces de todos los tamaños; abundantes poros, finos; buena actividad de la fauna; límite plano y neto.
AB	10-25	Pardo rojizo oscuro (5 YR 3.5/4) en húmedo; limo-arcilloso; estructura poliédrica angular, muy fina, moderada; muy friable en húmedo; frecuentes raíces de todos los tamaños; abundantes poros finos; buena actividad de la fauna, límite plano y brusco.
B _{tg}	25-50	Pardo (10 YR 4/4.5) en húmedo; manchas poco definidas, pequeñas, pardo claro (7.5 YR 5/6); limoso; estructura subangular, mediana, moderada; escasas gravillas de lutitas; muy friable en húmedo; cutanes de arcilla, delgados y continuos en las caras estructurales y paredes de los poros; pocas raíces de todos los tamaños; abundantes poros finos; buena actividad de la fauna; límite plano y neto.
C _g	50-80	Amarillo oscuro (2.5 Y 6/3) en húmedo; frecuentes manchas (10%), medianas(1cm), pardo rojizas (2.5 YR 4/8); limoso; estructura poliédrica, angular/laminar, mediana, moderado; escasas gravillas de lutita; friable en húmedo; cutanes de arcilla, espesos, en las caras estructurales y paredes de los poros; pocas raíces, de muy finas a medianas; abundantes poros finos; límite brusco y plano.
R	>80	Negro (10 YR 2/1) en húmedo; lutita estratificada; cutanes de arcilla en las caras de los estratos.

Dytria Regosol: Este suelo, con pendiente escarpada, está situado en la base de la parcela, en una zona de deslizamiento y mezcla de materiales de un argayo. Es un suelo muy joven. Tiene un drenaje bueno y el espesor efectivo es considerable. Por ello, una vez estabilizado, es el suelo con mayor productividad de la parcela. El inconveniente es su reducida extensión.



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
A	0-30	Pardo (10 YR 4/4) en húmedo; limo-arcilloso; estructura grumosa mediana, fuerte; muy friable en húmedo; cutanes de arcilla delgados y zonales; abundantes poros ; ligera actividad de la fauna; límite plano y difuso.
C	30-80	Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo; limo-arcilloso; algunas gravillas de lutitas (2%); estructura poliédrica angular, fina a muy fina, fuerte; friable en húmedo; cutanes de arcilla moderadamente espesos y continuos; parece apreciarse algunos cutanes de presión; pocas raíces, medianas; poros muy abundantes, finos.

2.3. Vegetación.

Vegetación actual: Pino de repoblación en terreno de pendiente moderada. Monte sometido a aprovechamiento ganadero (cabras) y matadero.

Estrato arbóreo compuesto en su mayoría por pinos de unos 20-25 m, con dos pies de *Quercus robur* y uno de *Salix atrocinerea* y *Robinia pseudoacacia*. El estrato arbustivo está dominado por las zarzas (*Rubus sp.*) y el resto de especies no ocupan superficie apreciable. El estrato herbáceo se puede dividir en dos elementos que se solapan: helechar de *Pteridium aquilinum* y pastizal dominado por *Agrostis capillaris*. El helechar se desarrolla por encima del estrato subarbustivo y el pastizal, y su cobertura varía estacionalmente. El pastizal se desarrolla bajo las zarzas y el helecho cubriendo aproximadamente el 80% de la superficie. El musgo, que ocupa un 65% de la superficie, está en su mayoría cubierto por el pastizal.

Inventarios florísticos posteriores añadieron 18 especies más a la flora de esta parcela como resultado de una prospección intensiva en el año 2001. Una especie herborizada en 1999 no se detectó en 2000.

TABLA 3: Inventario florístico 1999

	Cob		Cob
ESTRATO ARBÓREO		<i>Hypericum humifusum L.</i>	+
<i>Pinus radiata D. Don</i>	47.0	<i>Hypericum pulchrum L.</i>	+
<i>Quercus robur L.</i>	0.7	<i>Hypochoeris sp.</i>	+
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	+	<i>Juncus effusus L.</i>	+
<i>Salix atrocinerea Brot.</i>	+	<i>Lastrea limbosperma (All.) J. Holub & Pouzar</i>	+
ESTRATO ARBUSTIVO		<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	+
<i>Rubus sp.</i>	10.0	<i>Luzula multiflora (Retz.) Lej.</i>	+
<i>Calluna vulgaris (L.) Hull</i>	+	<i>Lysimachia nemorum L.</i>	+
<i>Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch</i>	+	<i>Oxalis acetosella L.</i>	+
<i>Erica cinerea L.</i>	+	<i>Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose</i>	+
<i>Euphorbia amygdaloides L.</i>	+	<i>Potentilla erecta (L.) Rauschel</i>	+
<i>Hedera helix L.</i>	+	<i>Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy</i>	+
<i>Lonicera periclymenum L.</i>	+	<i>Ranunculus tuberosus Lapeyr.</i>	+
<i>Ulex gallii Planch.</i>	+	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	+
ESTRATO SUBARBUSTIVO Y HERBÁCEO		<i>Tamus communis L.</i>	+
<i>Agrostis capillaris L.</i>	72.0	<i>Teucrium scorodonia L.</i>	+
<i>Pteridium aquilinum (L.) Kuhn</i>	44.0	<i>Viola riviniana Rchb.</i>	+
<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>	+	<i>Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.</i>	+
<i>Athyrium filix-femina (L.) Roth</i>	+	ESTRATO MUSCINAL Y LIQUÉNICO	
<i>Blechnum spicant (L.) Roth</i>	+	<i>Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.</i>	64.0

	Cob		Cob
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.	+	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	+
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg	+	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	+
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp	+
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	+	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	+
<i>Digitalis purpurea</i> L.	+	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dum.	+
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins	+	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.	+
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	+	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Lindb.	+
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	+	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	+
<i>Galium saxatile</i> L.	+		

Vegetación potencial: La parcela se encuentra en la serie 6a Serie colino-montana orocantábroatlántica mesofítica del fresno o *Fraxinus excelsior* (*Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum*).



2.4. Caracterización forestal y dasométrica.


La parcela se sitúa en una masa regular de pino de Monterrey de 40-60 años de edad, cuyas características principales se resumen a continuación:

La parcela se sitúa en una masa monoespecífica irregular de encina, cuyas características principales se resumen a continuación:

TABLA 4: Características dasométricas. Área de la parcela, número de pies en la parcela, densidad en pies/ha, Número de pies de la especie principal, número de pies de otras especies, número de pies muertos, edad media, diámetro medio, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, altura media, altura dominante, existencias.

Parcela	Área ha	N par	N/ha	Sp.p	Otras	Muerto	Edad años	D med (cm)	AB m ² /ha	D m c cm	Alt m m	Alt do m	Exist m ³ cc
45Pr	0,25	32	128	30	2	33	41-60	51,56	28,44	53,18	31,01	32,35	77,46





CD	N parc	N ha	h	Esb	Exist parc	Exist ha
7,5 - 12,5	1	4	6,7	66,51		
12,5 - 17,5						
17,5 - 22,5	1	4	16,8	83,76		
22,5 - 27,5						
27,5 - 32,5						
32,5 - 37,5	1	4	27,3	78,09	0,78	3,13
37,5 - 42,5	3	12	29,6	74,09	3,40	13,61
42,5 - 47,5	2	8	31,3	69,63	3,35	13,39
47,5 - 52,5	8	32	32,4	64,84	15,62	62,46
52,5 - 57,5	3	12	32,9	59,81	7,72	30,88
57,5 - 62,5	7	28	32,8	54,60	21,52	86,06
62,5 - 67,5	5	20	32,0	49,26	19,90	79,59
> 67,5	1	4			5,18	20,73
TOTAL	32	128			77,46	309,86

FIG 3: Distribución diamétrica de la parcela; distribución de alturas y comparación con las alturas media y dominante; relación de alturas-diámetros; frecuencias, alturas, esbelteces y existencias por clase diamétrica.

3. Estado fitosanitario de la parcela.

3.1. Defoliación y decoloración.

La defoliación media del punto experimentó un leve descenso respecto el año pasado situándose en el 18.8%. Se trata de un valor de defoliación ligero propio de un estado fitosanitario bueno y similar al apreciado en la mayoría de años anteriores excepción hecha de 1995, en el que se registró un defoliación del 13.5% (mínimo histórico que reflejaba un estado fitosanitario muy saludable), y los años 1997 y 2000, en el que la tala de varios pies incrementó notablemente la variable. En la presente evaluación la mayor parte de los pinos se consideraron ligeramente defoliados.

Los principales resultados pueden verse en el gráfico adjunto:




FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media de la parcela. Serie histórica.



FIG 5: Defoliación 15%, 20%

3.2. Daños forestales.

Los principales **agentes dañinos** identificados se resumen en la siguiente tabla, indicándose el número de pies afectados, sus características dendrométricas, defoliación y decoloración asociadas y la diferencia con los valores medios de la parcela.

TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela: pies afectados, pies afectados por ha, porcentaje de pies afectados, defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente, diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela, diámetro y altura medias de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela.

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
INSECTOS												
Defoliadores	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	11,00	8,00	-42,22	-23,05
Hojas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	11,00	8,00	-42,22	-23,05
Perforadores	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
Hojas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
ENFERMEDADES												
Tizón	2	1,00	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	62,00	26,65	8,78	-4,40
<i>Sphaeropsis shapinea</i>	2	1,00	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	62,00	26,65	8,78	-4,40
Acíc. todas edades	2	1,00	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	62,00	26,65	8,78	-4,40
Oidio	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
<i>Microsphaera alphitoides</i>	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
Hojas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
ABIÓTICOS												
Nieve/Hielo	10	1,20	40	31,25	19,00	0,00	0,25	0,00	58,00	33,26	4,78	2,21
Ramas 2-10 cm	3	1,00	12	9,38	16,67	0,00	-2,08	0,00	57,33	31,40	4,11	0,35
Ramas >10 cm	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	51,00	34,20	-2,22	3,15
Ramas tam. variable	6	1,33	24	18,75	20,00	0,00	1,25	0,00	59,50	34,03	6,28	2,99
Viento/Tornado	3	2,00	12	9,38	20,00	0,00	1,25	0,00	61,00	28,30	7,78	-2,75
Ramillos <2 cm	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	56,00	29,20	2,78	-1,85
Ramas tam. variable	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	63,00	35,50	9,78	4,45
Tronco en copa	1	4,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	64,00	20,20	10,78	-10,85
ANTRÓPICOS												
Cortas	4	1,00	16	12,50	16,25	0,00	-2,50	0,00	50,00	32,93	-3,22	1,88
Ramas 2-10 cm	1	1,00	4	3,13	15,00	0,00	-3,75	0,00	48,00	33,50	-5,22	2,45
Tronco	3	1,00	12	9,38	16,67	0,00	-2,08	0,00	50,67	32,73	-2,55	1,69
Op. en pies próximos	8	1,00	32	25,00	20,00	0,00	1,25	0,00	56,13	32,63	2,91	1,58
Cuello raíz	8	1,00	32	25,00	20,00	0,00	1,25	0,00	56,13	32,63	2,91	1,58
Otros daños antrópicos	5	1,00	20	15,63	17,00	0,00	-1,75	0,00	62,20	33,02	8,98	1,97
Tronco	5	1,00	20	15,63	17,00	0,00	-1,75	0,00	62,20	33,02	8,98	1,97
OTROS DAÑOS												
Falta luz	1	2,00	4	3,13	30,00	0,00	11,25	0,00	40,00	28,70	-13,22	-2,35
Acíc. todas edades	1	2,00	4	3,13	30,00	0,00	11,25	0,00	40,00	28,70	-13,22	-2,35
AGENTES DESCONOCIDOS												
Ag.desconocido	70	1,14	280	100,00	18,79	0,00	0,04	0,00	52,86	31,38	-0,36	0,33
Acíc. antiguas	25	1,00	100	78,13	18,60	0,00	-0,15	0,00	55,20	32,66	1,98	1,61
Acíc. todas edades	9	1,11	36	28,13	18,89	0,00	0,14	0,00	54,11	31,88	0,89	0,83
Brotos del año	2	1,00	8	6,25	17,50	0,00	-1,25	0,00	27,50	21,00	-25,72	-10,05
Ramillos <2 cm	10	1,00	40	31,25	18,50	0,00	-0,25	0,00	51,20	31,08	-2,02	0,03
Ramas tam. variable	7	1,00	28	21,88	19,29	0,00	0,54	0,00	57,43	30,71	4,21	-0,33
Guía principal	2	3,50	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	47,00	29,15	-6,22	-1,90

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Tronco en copa	6	1,00	24	18,75	18,33	0,00	-0,42	0,00	55,17	32,88	1,95	1,84
Tronco	8	1,50	32	25,00	19,38	0,00	0,63	0,00	46,75	29,54	-6,47	-1,51
Tronco completo	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	65,00	33,70	11,78	2,65

El estado fitosanitario de los pinos evaluados era bastante bueno, sin que en sus copas (parte alta) apenas se detectasen **ramillos puntisecos** y con menor número de **resinaciones** frescas que en años anteriores. Al igual que hace un año en la parte baja de las copas abundaron las **acículas viejas** con tonos rojizos aún prendidas. El principal agente de daño identificado fue la **nieve** y el **viento**, que provocaron la rotura de ramas de diverso calibre en aproximadamente un tercio del arbolado, si bien los daños causados eran de escasa incidencia. En la presente evaluación se volvió a desbrozar la parcela para su revisión, encontrándose algunas pequeñas **heridas** en la base de los troncos debidas a esta actuación. La fructificación era en general escasa. En el roble evaluado destacó la incidencia del **oidio** (*Microspheera alphitoides*)

El conjunto de **síntomas y signos** observados se resumen en la tabla adjunta.

TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela: pies afectados, pies afectados por ha, porcentaje de pies afectados, defoliación y decoloración de los pies afectados por cada síntoma, diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela, diámetro y altura medias de los pies afectados por cada síntoma y diferencias con los valores medios de la parcela.

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
HOJAS/ACÍULAS												
Acíc. antiguas	25	1,00	100	78,13	18,60	0,00	-0,15	0,00	55,20	32,66	1,98	1,61
Dec. Verde-amarillo	1	1,00	4	3,13	15,00	0,00	-3,75	0,00	48,00	33,50	-5,22	2,45
Completa	1	1,00	4	3,13	15,00	0,00	-3,75	0,00	48,00	33,50	-5,22	2,45
Dec. Rojo-marrón	24	1,00	96	75,00	18,75	0,00	0,00	0,00	55,50	32,62	2,28	1,57
Completa	24	1,00	96	75,00	18,75	0,00	0,00	0,00	55,50	32,62	2,28	1,57
Acíc. todas edades	12	1,17	48	37,50	20,00	0,00	1,25	0,00	54,25	30,74	1,03	-0,31
Comidos/perdidos	3	1,67	12	9,38	23,33	0,00	4,58	0,00	51,33	29,30	-1,89	-1,75
Totalmente comidas/perd.	3	1,67	12	9,38	23,33	0,00	4,58	0,00	51,33	29,30	-1,89	-1,75
Dec. Verde-amarillo	1	1,00	4	3,13	15,00	0,00	-3,75	0,00	64,00	33,50	10,78	2,45
Completa	1	1,00	4	3,13	15,00	0,00	-3,75	0,00	64,00	33,50	10,78	2,45
Dec. Rojo-marrón	8	1,00	32	25,00	19,38	0,00	0,63	0,00	54,13	30,94	0,91	-0,11
Completa	8	1,00	32	25,00	19,38	0,00	0,63	0,00	54,13	30,94	0,91	-0,11
Hojas	3	1,00	12	9,38	20,00	0,00	1,25	0,00	17,00	10,00	-36,22	-21,05
Comidos/perdidos	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	11,00	8,00	-42,22	-23,05
Minadas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	11,00	8,00	-42,22	-23,05
Dec. Verde-amarillo	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
Punteado	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
Signos hongos	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
Cob. blanca hojas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	20,00	11,00	-33,22	-20,05
RAMAS/BROTOS												
Brotos del año	2	1,00	8	6,25	17,50	0,00	-1,25	0,00	27,50	21,00	-25,72	-10,05
Muerto/moribundo	2	1,00	8	6,25	17,50	0,00	-1,25	0,00	27,50	21,00	-25,72	-10,05
Ramillos <2 cm	11	1,00	44	34,38	18,64	0,00	-0,11	0,00	51,64	30,91	-1,58	-0,14
Rotura	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	56,00	29,20	2,78	-1,85
Muerto/moribundo	10	1,00	40	31,25	18,50	0,00	-0,25	0,00	51,20	31,08	-2,02	0,03
Ramas 2-10 cm	4	1,00	16	12,50	16,25	0,00	-2,50	0,00	55,00	31,93	1,78	0,88
Rotura	3	1,00	12	9,38	15,00	0,00	-3,75	0,00	55,33	32,90	2,11	1,85

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Heridas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	54,00	29,00	0,78	-2,05
Otras heridas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	54,00	29,00	0,78	-2,05
Ramas >10 cm	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	51,00	34,20	-2,22	3,15
Rotura	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	51,00	34,20	-2,22	3,15
Ramas tam. variable	14	1,14	56	43,75	19,64	0,00	0,89	0,00	58,71	32,48	5,50	1,43
Rotura	6	1,33	24	18,75	20,00	0,00	1,25	0,00	58,67	34,03	5,45	2,99
Muerto/moribundo	7	1,00	28	21,88	19,29	0,00	0,54	0,00	59,14	31,61	5,92	0,57
Resinosis	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	56,00	29,20	2,78	-1,85
Guía principal	2	3,50	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	47,00	29,15	-6,22	-1,90
Muerto/moribundo	2	3,50	8	6,25	20,00	0,00	1,25	0,00	47,00	29,15	-6,22	-1,90
TRONCO/C.RAIZ												
Tronco en copa	7	1,43	28	21,88	18,57	0,00	-0,18	0,00	56,43	31,07	3,21	0,02
Rotura	1	4,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	64,00	20,20	10,78	-10,85
Heridas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	57,00	33,20	3,78	2,15
Otras heridas	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	57,00	33,20	3,78	2,15
Resinosis	5	1,00	20	15,63	18,00	0,00	-0,75	0,00	54,80	32,82	1,58	1,77
Tronco	16	1,25	64	50,00	18,13	0,00	-0,63	0,00	52,31	31,23	-0,91	0,18
Deformaciones	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	36,00	28,30	-17,22	-2,75
Otras deformaciones	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	36,00	28,30	-17,22	-2,75
Heridas	10	1,20	40	31,25	17,50	0,00	-1,25	0,00	53,00	30,05	-0,22	-1,00
Descortezamientos	1	1,00	4	3,13	10,00	0,00	-8,75	0,00	77,00	33,50	23,78	2,45
Otras heridas	9	1,22	36	28,13	18,33	0,00	-0,42	0,00	50,33	29,67	-2,89	-1,38
Resinosis	4	1,00	16	12,50	18,75	0,00	0,00	0,00	58,00	33,90	4,78	2,85
Inclinado	1	3,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	39,00	35,20	-14,22	4,15
Cuello raíz	8	1,00	32	25,00	20,00	0,00	1,25	0,00	56,13	32,63	2,91	1,58
Heridas	8	1,00	32	25,00	20,00	0,00	1,25	0,00	56,13	32,63	2,91	1,58
Otras heridas	8	1,00	32	25,00	20,00	0,00	1,25	0,00	56,13	32,63	2,91	1,58
Tronco completo	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	65,00	33,70	11,78	2,65
Resinosis	1	1,00	4	3,13	20,00	0,00	1,25	0,00	65,00	33,70	11,78	2,65

Se presenta a continuación la relación entre agentes dañinos identificados y los distintos síntomas observados.

TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados

	N par	Defoliadores		Perforadores		Tizón		Oidio	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍULAS									
Acíc. antiguas	25								
Dec. Verde-amarillo	1								
Completa	1								
Dec. Rojo-marrón	24								
Completa	24								
Acíc. todas edades	12					2	6,25		
Comidos/perdidos	3								
Totalmente comidas/perd.	3								
Dec. Verde-amarillo	1								
Completa	1								
Dec. Rojo-marrón	8					2	6,25		
Completa	8					2	6,25		

	N par	Defoliadores		Perforadores		Tizón		Oidio	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Hojas	3	1	3,13	1	3,13			1	3,13
Comidos/perdidos	1	1	3,13						
Minadas	1	1	3,13						
Dec. Verde-amarillo	1			1	3,13				
Punteado	1			1	3,13				
Signos hongos	1							1	3,13
Cob. blanca hojas	1							1	3,13
RAMAS/BROTOS									
Brotos del año	2								
Muerto/moribundo	2								
Ramillos <2 cm	11								
Rotura	1								
Muerto/moribundo	10								
Ramas 2-10 cm	4								
Rotura	3								
Heridas	1								
Otras heridas	1								
Ramas >10 cm	1								
Rotura	1								
Ramas tam. variable	14								
Rotura	6								
Muerto/moribundo	7								
Resinosis	1								
Guía principal	2								
Muerto/moribundo	2								
TRONCO/C.RAIZ									
Tronco en copa	7								
Rotura	1								
Heridas	1								
Otras heridas	1								
Resinosis	5								
Tronco	16								
Deformaciones	1								
Otras deformaciones	1								
Heridas	10								
Descortezamientos	1								
Otras heridas	9								
Resinosis	4								
Inclinado	1								
Cuello raíz	8								
Heridas	8								
Otras heridas	8								
Tronco completo	1								
Resinosis	1								

	N par	Nieve/Hielo		Viento/Tornado		Cortas		Op. en pies próximos	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍULAS									
Acíc. antiguas	25								
Dec. Verde-amarillo	1								
Completa	1								
Dec. Rojo-marrón	24								
Completa	24								
Acíc. todas edades	12								
Comidos/perdidos	3								
Totalmente comidas/perd.	3								
Dec. Verde-amarillo	1								
Completa	1								
Dec. Rojo-marrón	8								
Completa	8								
Hojas	3								
Comidos/perdidos	1								
Minadas	1								
Dec. Verde-amarillo	1								
Punteado	1								
Signos hongos	1								
Cob. blanca hojas	1								
RAMAS/BROTES									
Brotos del año	2								
Muerto/moribundo	2								
Ramillos <2 cm	11			1	3,13				
Rotura	1			1	3,13				
Muerto/moribundo	10								
Ramas 2-10 cm	4	3	9,38			1	3,13		
Rotura	3	2	6,25			1	3,13		
Heridas	1	1	3,13						
Otras heridas	1	1	3,13						
Ramas >10 cm	1	1	3,13						
Rotura	1	1	3,13						
Ramas tam. variable	14	6	18,75	1	3,13				
Rotura	6	5	15,63	1	3,13				
Muerto/moribundo	7	1	3,13						
Resinosis	1								
Guía principal	2								
Muerto/moribundo	2								
TRONCO/C.RAIZ									
Tronco en copa	7			1	3,13				
Rotura	1			1	3,13				
Heridas	1								
Otras heridas	1								
Resinosis	5								
Tronco	16					3	9,38		
Deformaciones	1								
Otras deformaciones	1								
Heridas	10					3	9,38		
Descortezamientos	1								
Otras heridas	9					3	9,38		


	N par	Nieve/Hielo		Viento/Tornado		Cortas		Op. en pies próximos	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Resinosis	4								
Inclinado	1								
Cuello raíz	8							8	25,00
Heridas	8							8	25,00
Otras heridas	8							8	25,00
Tronco completo	1								
Resinosis	1								



	N par	Otros daños antrópicos		Falta luz		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍULAS							
Acíc. antiguas	25					25	78,13
Dec. Verde-amarillo	1					1	3,13
Completa	1					1	3,13
Dec. Rojo-marrón	24					24	75,00
Completa	24					24	75,00
Acíc. todas edades	12			1	3,13	9	28,13
Comidos/perdidos	3			1	3,13	2	6,25
Totalmente comidas/perd.	3			1	3,13	2	6,25
Dec. Verde-amarillo	1					1	3,13
Completa	1					1	3,13
Dec. Rojo-marrón	8					6	18,75
Completa	8					6	18,75
Hojas	3						
Comidos/perdidos	1						
Minadas	1						
Dec. Verde-amarillo	1						
Punteado	1						
Signos hongos	1						
Cob. blanca hojas	1						
RAMAS/BROTOS							
Brotos del año	2					2	6,25
Muerto/moribundo	2					2	6,25
Ramillos <2 cm	11					10	31,25
Rotura	1						
Muerto/moribundo	10					10	31,25
Ramas 2-10 cm	4						
Rotura	3						
Heridas	1						
Otras heridas	1						
Ramas >10 cm	1						
Rotura	1						
Ramas tam. variable	14					7	21,88
Rotura	6						
Muerto/moribundo	7					6	18,75
Resinosis	1					1	3,13
Guía principal	2					2	6,25
Muerto/moribundo	2					2	6,25
TRONCO/C.RAIZ							

	N par	Otros daños antrópicos		Falta luz		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
Tronco en copa	7					6	18,75
Rotura	1						
Heridas	1					1	3,13
Otras heridas	1					1	3,13
Resinosis	5					5	15,63
Tronco	16	5	15,63			8	25,00
Deformaciones	1					1	3,13
Otras deformaciones	1					1	3,13
Heridas	10	5	15,63			2	6,25
Descortezamientos	1	1	3,13				
Otras heridas	9	4	12,50			2	6,25
Resinosis	4					4	12,50
Inclinado	1					1	3,13
Cuello raíz	8						
Heridas	8						
Otras heridas	8						
Tronco completo	1					1	3,13
Resinosis	1					1	3,13



FIG 6: Heridas causadas por la desbrozadota.



MODELOS DE DEFOLIACION		
		
2006	2007	

Los dos principales parámetros para evaluar el estado de salud en masas forestales son la **defoliación** y **decoloración**

DEFOLIACION: se entiende por defoliación la pérdida de hojas/acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable, es decir, eliminando del proceso de estima la copa muerta (ramas y ramillos claramente muertos) y la parte de la copa con ramas secas por poda natural o competencia.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de defoliación o daño:

- ✓ **Arboles sin daño:** defoliación 0-10%
- ✓ **Ligeramente dañados:** defoliación 15-25%
- ✓ **Moderadamente dañados:** defoliación 30-60%
- ✓ **Gravemente dañados:** defoliación 65-95%
- ✓ **Arboles muertos:** defoliación 100%

DECOLORACION: se entiende por decoloración, la aparición de coloraciones anormales en la totalidad del follaje o en una parte apreciable del mismo, utilizándose en su evaluación un criterio subjetivo que implica el conocimiento del medio forestal correspondiente por parte del evaluador.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de decoloración:

- ✓ **Clase 0:** decoloración nula
- ✓ **Clase 1:** decoloración ligera
- ✓ **Clase 2:** decoloración moderada
- ✓ **Clase 3:** decoloración grave

Defoliación	
	0.00-12.50
	12.51-17.50
	17.51-22.50
	22.51-27.50
	27.51-37.50
	37.51-50.00
	50.01-62.50
	62.51-75.00
	75.01-88.10
	88.11-99.00
	99.10-100.00