


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 31 de julio de 2024


Los modelos consultados prevén la entrada de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 31 de julio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y centro de la Península, 10-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste, 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, noroeste y norte peninsular y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el archipiélago balear. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y las islas Baleares, y húmedo sobre el norte y noreste peninsular a lo largo del día.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 31 de julio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y centro de la Península, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, este, noroeste, norte y noreste peninsular y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el archipiélago canario.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para el día 31 de julio de 2024 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.


El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 31 de julio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 1-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro, este y noreste, 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y norte peninsular y las islas Baleares y 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste peninsular.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 31 de julio de 2024 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.


El modelo NAAPs no estaba actualizado en el momento de redactar este informe.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 31 de julio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste, centro, este, noroeste, norte y noreste de la Península y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el archipiélago balear.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 31 de julio de 2024 a las 00 y 12h. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias a lo largo del día 31 de julio, favorecido por las altas presiones predominantes sobre el Mediterráneo occidental y la borrasca situada sobre el suroeste de Europa.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para el día 31 de julio de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 31 de julio de 2024 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y las islas Baleares, y húmedo sobre el norte y noreste peninsular a lo largo del día 31 de julio.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 31 de julio de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 31 de julio de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 30 de julio de 2024

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.