


## Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 3 de mayo de 2016


Los modelos prevén la entrada de masas de aire africano en superficie por el sur de la Península a lo largo del día 3 de mayo. Las concentraciones de polvo en superficie podrían ser inferiores a  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sur peninsular a lo largo del día 3 de mayo.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la entrada de masas de aire africano a nivel de superficie por el sur de la Península durante el día 3 de mayo. Estima concentraciones de polvo en el rango  $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  para el suroeste peninsular.




Concentración de polvo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 3 de mayo de 2016 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB/BSC-Dust prevé también la presencia de polvo en superficie sobre el sureste de la Península para el día 3 de mayo. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango  $10\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .




Concentración de polvo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 3 de mayo de 2016 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la entrada de masas de aire africano en superficie por el sur de la Península para el día 3 de mayo. Estima concentraciones de polvo en el rango 1-50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  para el sureste peninsular.




Concentración de polvo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) predicha por el modelo SKIRON para el día 3 de mayo de 2016 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPS no coincide con los demás modelos y no prevé la presencia de masas de aire africano sobre la Península para el día 3 de mayo.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 3 de mayo de 2016 a las 00:00 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y de altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON muestran el transporte de las masas de aire africano sobre el sur de la Península a lo largo del día 3 de mayo, favorecido por la presencia de un centro de bajas presiones situado sobre Marruecos y un anticiclón sobre el Mediterráneo.




Carga total de polvo (mg/m<sup>2</sup>) predicha por el modelo SKIRON para el día 3 de mayo de 2016 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 3 de mayo 2016 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sur peninsular a lo largo del día 3 de mayo.



Depósito seco de polvo ( $\text{mg}/\text{m}^2$ ) predicho por el modelo SKIRON para el día 3 de mayo de 2016 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Fecha de elaboración de la predicción: 2 de mayo de 2016

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC).

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España”.