


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 30 de junio de 2022


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 30 de junio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y este peninsular y las islas Baleares. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sureste, centro, este y noreste de la Península y las islas Baleares, y húmedo sobre la zona de los pirineos a lo largo del día.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 30 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y este peninsular.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB-MONARCH para el día 30 de junio de 2022 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península y las islas Baleares para el día 30 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste peninsular, 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste e inferiores a 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para otras zonas de la Península y las islas Baleares.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 30 de junio de 2022 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPS no prevé la presencia de polvo africano en concentraciones superiores a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la Península, las islas Baleares ni las islas Canarias para el día 30 de junio.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 30 de junio de 2022 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 30 de junio de 2022 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Baleares para el día 30 de junio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-20 µg/m³ para el sureste y este de la Península y las islas Baleares.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en µg/m³) para el día 30 de junio de 2022 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran la presencia de masas de aire africano sobre el sureste y este de la Península y las islas Baleares durante el día 30 de junio, favorecida por la borrasca situada sobre la Península y el norte de África y el anticiclón centrado en el Mediterráneo.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para el día 30 de junio de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 30 de junio de 2022 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sureste, centro, este y noreste de la Península y las islas Baleares, y húmedo sobre la zona de los pirineos a lo largo del día 30 de junio.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 30 de junio de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 30 de junio de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 29 de junio de 2022

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.