


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para los días 12, 13 y 14 de noviembre. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península y las islas Canarias, 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro y suroeste peninsular y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este, norte y noreste. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sureste, suroeste, centro y norte de la Península y las islas Canarias, y húmedo sobre el sureste, este, centro, norte y noreste peninsular y las islas Baleares a lo largo de los tres días.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para los días 12 y 13 de noviembre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y sureste de la Península, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro y noreste y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este, noroeste y norte peninsular y los archipiélagos balear y canario.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para los días 12 y 13 de noviembre de 2022 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península y las islas Canarias para los días 12, 13 y 14 de noviembre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península, 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro, 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, este y norte peninsular, e inferiores a 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste y noreste peninsular y las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPS no prevé la presencia de polvo en concentraciones superiores a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la Península o las islas Baleares. Este modelo estima concentraciones de polvo en superficie en el rango $20\text{-}80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la zona de las islas Canarias.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para los días 12 y 13 de noviembre de 2022 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para los días 12 y 13 de noviembre de 2022 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén también la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para los días 12 y 13 de noviembre. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste y centro peninsular y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este, noroeste, norte y noreste peninsular y las islas Baleares.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para los días 12 y 13 de noviembre de 2022 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el desplazamiento de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias previsto para los días 12, 13 y 14 de noviembre, favorecido por la borrasca situada al noroeste de Europa y las altas presiones predominantes Europa y el norte de África.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre el sureste, suroeste, centro y norte de la Península y las islas Canarias, y húmedo sobre el sureste, este, centro, norte y noreste peninsular y las islas Baleares a lo largo de los días 12, 13 y 14 de noviembre.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2022 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 11 de noviembre de 2022

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.