

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2° A 131
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Masa adulta y densa, de buena calidad de madera, con alguna corta (tipo huroneo, tal vez secos) de hace unos diez años. Regeneración en estado de repoblado, relativamente frecuentes con buen aspecto, pero que precisará en su día cortas aclaratorias fuertes. En la parte baja árboles chamosos y atacados por muérdago. Hay instaladas trampas contra Ips.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, poco denso, con frecuentes corros de regeneración más abundantes por encima de la carretera, dispersos por toda la superficie, en estado de repoblado y a veces monte bravo.
Regeneración	Iniciada. Corros bastante frecuentes extendidos por todo el cantón en estado de repoblado, a veces monte bravo bajo un dosel denso aún. de árboles padre.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias hace unos 15 años. Cortas recientes de secos. Es necesario realizar cortas aclaratorias.
Matorral	Solo algo de helecho y presencia de rosa silvestre.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª A 132
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>También soporta una masa adulta y densa, con regeneración por corros muy joven, en toda su superficie. En menor cantidad, la regeneración, que en el cantón anterior, aunque alguna zona abierta, como la de la Fuente de la Vereda del Risco, cortada hace 6 ó 7 años muestra una pujante pimpollada. Hay chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, poco denso, con frecuentes corros de regeneración, dispersos por toda la superficie, en estado de repoblado y a veces monte bravo.
Regeneración	Iniciada. Corros bastante frecuentes extendidos por todo el cantón en estado de repoblado, a veces monte bravo bajo un dosel denso aún, de árboles padre.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias hace unos 15 años. Cortas recientes de secos. Es necesario realizar cortas aclaratorias.
Matorral	Solo algo de helecho y presencia de rosa silvestre.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª A 133
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	Masa adulta, en exposición de umbría, con muy poca regeneración y la existente por corros en estado de repoblado. Alguna pimpollada, pocas. Regeneración muy pujante en un raso producido por un vendaval (1981). Muérdago relativamente frecuente, y chamosos.
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto aún denso bajo el que se está iniciando la regeneración como corros dispersos, frecuentes e incipientes de repoblado-monte bravo. Se vana desarrollar aún más por cortas recientes de pies secos o extracortables.
Regeneración	Iniciándose en toda la superficie, en forma de pequeños corros, dispersos, densos e incipientes de monte bravo.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias por aclareo sucesivo uniforme hace unos 15 años. Cortas de mejora de pies secos y extracortables o enfermos de este año.
Matorral	Corros de retama hacia el mirador.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Se ha visto un corzo con crías.

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2º A 134
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Masa adulta, en exposición de solana, densa y con poquísima regeneración natural. Se practicaron hace, cuatro o cinco años, cortas a hecho en dos bosquetes de aproximadamente media hectárea sin ningún resultado en cuanto a regeneración. Posibles explicaciones a esta ausencia de repoblado pueden ser por una parte las sequías estivales padecidas y la vecería del arbolado. Por otra parte contrasta el efecto de estas cortas, en solana, con el raso producido por el vendaval reseñado en el cantón 133, (de umbría), con magnífica regeneración. Algo de muérdago en la zona inferior.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto y denso sin regeneración, con abundante sotobosque de retama, a veces densa. Bosquetes de cortas a hecho sin regeneración y completamente invadidos por retama y principalmente por piorno.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian. Algo de pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Cortas de pies secos o extracortables muy recientes.
Matorral	Retama abundante bajo el pinar, a veces denso. Piorno en las cortas a hecho. Presencia de acebo. En el mirador, majuelo y rosal silvestre.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 135
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>En su zona superior fustal espeso y poca regeneración. En el paraje de La Camorquilla se observa algún corro, y también por debajo de dicho lugar. Desde la Vereda de los Reventones hacia arriba también escasa, y abundancia de retamas.</i> <i>En el límite con el cuartel de Aldeanueva, en una zona con trincheras de la guerra civil hay bastante regeneración: monte bravo e incluso latizal.</i> <i>En la parte baja y hacia el cantón 137 regeneración abundante, masa adulta mucho más abierta. Necesidad de clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En el tercio sur del cantón, fustal alto con frecuentes e incipientes corros de regeneración aislados aunque extensos, en estado de repoblado-monte bravo. En los dos tercios al norte del cantón, fustal denso sin regeneración. La última parte, junto al cantón 134, fustal bajo, denso y sin regeneración.
Regeneración	En el tercio sur, regeneración ya iniciada con corros frecuentes y extensos de repoblado-monte bravo, bajo un dosel de copas. No hay en el resto.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian en general; algunos pies muertos en pie.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias en el tercio sur del cantón, de aproximadamente 15 años y nada en el resto. Necesidad de realizar cortas diseminatorias o aclaratorias.
Matorral	Helecho. Retama (Genista) en la parte superior.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º A 136
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Junto al cantón 134 abundante regeneración con árboles padre que empiezan a sobrar. Es una zona de monte bravo e incluso latizal. En la parte baja la regeneración también es muy importante, necesitando corta de árboles padre y clareos. Todo el centro del cantón es un fustal claro con regeneración muy extendida que compite con un retamar muy desarrollado que impide la total regeneración. Es necesario un desbroce.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón globalmente irregular ya que presenta zonas de fustal sin regeneración junto a zonas de latizal bajo/alto densas sin árboles padre y zonas de fustal alto abierto poco denso con corros de regeneración densos, por la parte inferior.
Regeneración	En plena transformación, con zonas de regeneración incipiente, en corros de monte bravo densos bajo dosel de copas superior, junto a zonas de latizal bajo transformadas y zonas sin empezar la regeneración.
Problemas fitosanitarios	Bastante pedregoso. Algunas tollas.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de terminar las cortas de regeneración, acometiendo las aclaratorias. Ha habido cortas de secos por la parte inferior, que favorecerán aún más la instalación de regenerado.
Matorral	Bastante retama, acebo abundante. Zonas con helecho y rosales.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Levantar el vuelo 3 buitres negros.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 137
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>En su parte superior y en los bordes laterales tiene regeneración bajo un fustal reviejo y claro. Su zona media está formada por masas muy cerradas, latizales e incluso fustales jóvenes, con abundancia de dominados y árboles respaldares. Son muy necesarias las claras, que en algún corro casi tendrían carácter de cortas preparatorias.</i> <i>En la parte baja del Carril de la Majada de los Cochinos, una gran regeneración bajo árboles padre que empiezan a sobrar, y otros corros con necesidad de cortas aclaratorias. Zonas de pedriza que conviene cortar muy prudentemente. Zonas con necesidad de claras.</i> <i>Sería un cantón con tres clases de edad, y debe de considerarse que el latizal del centro ya es masa transformada.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Parte superior: masa semirregular de latizal alto con abundante latizal bajo muy dañado por los derribos de la nevada del año 1996. En plena transformación. Por la parte inferior es un fustal bajo a medio, muy limpio, y sin regeneración.
Regeneración	En plena transformación por la parte alta, al tratarse de un latizal bajo, que era denso antes de la nevada del 96, bajo un dosel de copas importante; por abajo no hay.
Problemas fitosanitarios	Arriba muy dañado por las nevadas del año 1996, aún sin limpiar.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de limpiar los derribos de la parte superior (clara mixta fuerte e irregular por zonas); cortas de secos recientes por la parte inferior.
Matorral	Bastante limpio. Presencia de piorno por arriba y enebro; retama por abajo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2° A 138
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: B	<i>Aunque en la zona superior, en la cuerda, hay pequeños rasos y regeneración escasa, puede considerarse un cantón transformado en el que queda una importante masa residual.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Latizal alto y denso con abundantes derribos que se han aclarado ahora con una clara mixta, fuerte y a veces excesiva.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Muchos derribos que se están aclarando ahora.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta fuerte, a veces excesiva por zonas debido a la nevada de 1996.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª A 139
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>En la parte superior abunda la retama bajo el pinar; luego éste se aclara. En el límite con el cantón 137, latizales análogo a los de dicho cantón, que precisan claras para eliminar pies dominados y respaldares. El resto del cantón presenta una regeneración muy extendida, en uno caso con árboles padre que conviene cortar cuanto antes; en otros la regeneración es joven y requiere aún protección, y convendrá esperar algo para ejecutar las cortas aclaratorias. En algunos corros densísimos de latizal joven hay necesidad de clareos. En general aspecto irregular: tres o más clases de edad.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Parte alta: por encima del carril de la Majada del Cochino, fustal bajo con abundantes derribos, ya limpios aunque sin sacar aún, sin regeneración y bastante denso, a pesar de los derribos. Por debajo del carril, el aspectop cambia sustancialmente, pasando a ser un fustal alto con latizal bajo disperso por toda la superficie, con pocos derribos, que conforme se va bajando por el cantón, cada vez es menos frecuente la presencia de latas. El cantón tiene aspecto de semirregular por la presencia de estas latas.
Regeneración	No hay, sino latas dispersas bajo el fustal, a veces algún bosque.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos por arriba y en las caídas al Arroyo de las Pamplinas.
Tratamientos selvícolas	Sólo la limpia de los derribos de la nevada del 96.
Matorral	Presencia de Genista y presencia de acebo por la parte inferior.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Levantar el vuelo numerosos buitres. Bastantes pinos posaderos.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 140
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Parte alta regeneración con árboles padre que empiezan a sobrar, alternando con zonas de fustal abierto que precisan o van a precisar cortas aclaratorias. Inmediatamente por debajo, zona media-alta, latizal medio densísimo con árboles padre salpicados, que hay que cortar y dar al mismo tiempo un clareo. La parte baja es un latizal alto con necesidad de declarar que deberán extraer dominados y respaldares. Un raso en Peñagorda, pero con alguna pimpollada. También aspecto irregular, pero menos que el 139.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Parte alta: masa semirregular de fustal medio con latizal bajo, a veces como individuos diseminados, a veces como bosquetes densos. Sin regeneración incipiente y reciente, pero en plena transformación, por la citada presencia de latas. Conforme se baja por el cantón, la presencia de latas disminuye a favor del fustal que pasa de ser fustal medio a fustal alto.
Regeneración	Presencia de bosquetes y latas dispersas por la parte superior del cantón. No hay regeneración reciente.
Problemas fitosanitarios	Derribos abundantes por la parte superior aún sin limpiar.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de limpiar los derribos; si se considerara necesario en la marcha de la Ordenación se podrían afrontar las cortas diseminatorias.
Matorral	Presencia de helecho y retama. Por abajo, acebo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Levantán el vuelo numerosos buitres. Muchos pinos posaderos.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 141
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>En su parte baja, junto al cantón 140, latizales con necesidad de claras bajas. Alguna pimpollada joven y algún corro de fustal sin regeneración. Una corta en 1988.</i> <i>En zonas medias y altas tienen una primera mitad a poniente sin regeneración, fustal alto, salvo el rincón con Aldeanueva. La mitad oriental con bastante regeneración. más o menos ahogada.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón globalmente semirregular, por presencia de fustal medio con abundantes corros de regeneración, en estado de monte bravo y latizal bajo, aunque aislados, en la parte superior. Existen zonas ya transformadas en estado de latizal, muy denso, sin dosel de árboles padre, por la parte inferior del cantón y en el rincón suroeste, junto a la Pradera de la Venta. También hay zonas sin nada de regeneración por la parte alta, de fustal medio, abierto y con problemas para la regeneración por erosión superficial laminar y abundancia de matorral y escaso suelo.
Regeneración	Iniciándose en la parte superior, por corros aislados aunque frecuentes en estado de monte bravo/latizal bajo. Masa transformada por la parte inferior.
Problemas fitosanitarios	Muy poco suelo y bastante pedregoso, en zonas con erosión laminar, especialmente en las solanas de los arroyos que discurren por la parte sur del cantón, agravado por la abundancia de ganado. Algunos derribos por la parte superior del cantón, en las caídas de la divisoria de Berciales al Arroyo de las Horcas.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias de unos 25 años arriba; más antiguas aún y aclaratorias por la parte baja. Corta a hecho en la parte superior, vallada y repoblada por hoyos, sin conseguirse: con problemas.
Matorral	Genista pr todo el cantón y por zonas helecho. Presencia de piorno en la parte alta y de estepa en las solanas.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Un buitre que levanta el vuelo. Un jabalí que sale corriendo.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 142
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>En general este cantón, lo mismo que los 143 y 144, con los que formaba el tramo I del cuartel, es una masa transformada, latizal alto y fustal joven, pues la regeneración debió de conseguirse en etapas diferentes, alguna muy lejana. Necesidad de claras bajas que eliminan dominados, dañados y enfermos. Hay algún corro de masa vieja, escasos, con algo de regeneración ahogada, y también regeneración que se anticipa bajo el latizal (poco).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal medio, muy denso, de considerable altura, muy limpio y sin regeneración excepto los pequeños golpes de monte bravo que se han producido por algún derribo o corta de algún pie seco.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Bastantes pies respaldares y algún chamoso.
Tratamientos selvícolas	No ha habido.
Matorral	Helecho de poca potencia por todo el cantón. Presencia de acebo y enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 143
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Análogo al anterior. Precisa claras bajas. Hay algo de latizal bajo y pimpollada cerca del cantón 144.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto denso regular, muy limpio y sin regeneración, excepto los típicos corros aislados y ahogados producidos por huecos por derribos o cortas de secos.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Bastantes chamosos y algunos respaldares. Algunas tollas.
Tratamientos selvícolas	Cortas de secos en las cercanías de Peña Gorda.
Matorral	Sólo helecho de poca potencia. Presencia de enebro, Genista y acebo, a veces algún bosquete (por el suroeste de Peña Gorda). Algunos acebos aparecen puntisecos.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2º A 144
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Es el cantón más extenso del Pinar de Valsaín (97,3 ha) y a pesar de ello es mayoritariamente una masa transformada (latizal y/o fustal joven) análoga a la de los dos cantones anteriores. Necesidad urgente de claras bajas: hay dominados que se están secando. Existe una zona rasa (Raso de las Pamplinas). Hacia el río, pimpolladas jóvenes y escasos árboles padre.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal medio por al parte alta, a veces con tendencia a fustal bajo, y fustal alto por la parte inferior, muy denso, limpio y sin regeneración, excepto en el extremo norte cerca del límite con el cantón 145. Por abajo aparecen bosquetes de latizal alto denso que le confieren a la parte baja una cierta tendencia a la semirregularidad (entre la Pradera de las Pamplinas y el Batán de Vargas).
Regeneración	No hay excepto corros ahogados de monte bravo frecuentes cerca del límite del 145 por encima del Puente de los Vadillos.
Problemas fitosanitarios	Abundantes chamosos y respaldares. Algo rocoso en el centro del cantón.
Tratamientos selvícolas	Marcada una corta preparatoria sobre dominados en la parte norte, cerca del límite con el 145 para liberar la regeneración incipiente.
Matorral	No hay salvo helecho de poca potencia por todo el cantón. Presencia de Genista.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 145
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>El callejón de Barnola, que se cortó a hecho, hace unos cuarenta años, se regeneró y es hoy un latizal bajo. El resto, y mayor parte del cantón, es una masa bastante vieja y densa, con una regeneración escasa, por corros, ahogada y decrepita. En algunos lugares las cortas de hace diez años (secos o huroneo) ha abierta la masa y la regeneración pugna por salir. Se considera un cantón cuya regeneración puede iniciarse pues la pre-existente tiene escasas probabilidades de prosperar (salvo el callejón de Barnola).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto con latas altas intercaladas (tienen aspecto de ser pies dominados) medianamente denso bajo el que existe una regeneración incipiente extendida en corros grandes aunque aislados de monte bravo, junto a zonas sin regenerar y con golpes de enebro a veces importantes.
Regeneración	Iniciándose, por grandes corros extensos aunque aislados en estado de monte bravo bajo cubierta aún importante de fustal.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias hace 10 a 15 años. Necesidad de continuar e impulsar la regeneración.
Matorral	Enebro en golpes densos y abundantes, que pueden dificultar la regeneración. Presencia de acebo y retama.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º A 146
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>Análogo al anterior. Alguna pimpollada en antiguos claros. Algo de muérdago.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Por la parte superior: fustal medio denso, muy limpio, sin regeneración y sin matorral, que conforme se avanza de sur a norte por la parte alta, se va transformando en un fustal denso con corros de regeneración en estado de repoblado a monte bravo densos y extendidos, especialmente a partir de la Peña del Buitre. Por la parte inferior es un fustal denso con corros de regeneración abundantes en estado de monte bravo/repoblado.
Regeneración	Iniciada en la mayor parte del cantón, reciente, en forma de corros densos y extensos de repoblado/monte bravo bajo importante dosel de copas superior. Hay que continuarla.
Problemas fitosanitarios	Respaldares por arriba. Bastantes chamosos por abajo.
Tratamientos selvícolas	Hay que hacer las cortas aclaratorias para desarrollar aún más la regeneración. Ha habido cortas de secos por abajo, y hay marcada una corta de secos hacia el 145.
Matorral	Retama abundante junto a la Peña del Buitre; acebo frecuente. Por abajo, hay algo de retama y helecho de poca potencia.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 147
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>Análogo a los dos anteriores, quizá con mayor extensión de regeneración sumergida. Bastante muérdago y pies chamosos. Ausencia de regeneración en algunos claros, probablemente por la gente que desde el cuartel de recreo cruza el río y pisotea o estropea el regenerado.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular de monte bravo con dosel importante de árboles padre presente aún por encima. Hay marcada una corta aclaratoria, moderada.
Regeneración	En plena transformación, con abundantes y extensos corros de monte bravo bajo el dosel de copas superior. A pesar de encontrarse en el grupo en preparación, habría que terminar de regenerarlo por completo en el presente semiperiodo, máxime cuando tiene ya marcada una corta aclaratoria fuerte.
Problemas fitosanitarios	Bastante pino chamoso y respaldar por la parte inferior.
Tratamientos selvícolas	Marcada corta aclaratoria, aún sin realizar. Necesidad de finalizar la transformación de este cantón.
Matorral	Retama y acebo frecuentes. Majuelo abundante en las tollas del límite con el 148.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	En el límite con el 148 hay bastantes pinos tapizados de hiedra.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 148
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Tiene en su parte superior bastante acebo, que en su día podría dificultar la regeneración del pinar. En general masa densa de fustal bajo la que empieza a instalarse una buena regeneración. En la zona baja abundan los pies chamosos y los atacados por muérdago.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, más denso por la parte superior que por la inferior, con algunos corros de monte bravo aislados en la parte superior y en la inferior central y más abundantes en las caídas a los arroyos que lo limitan al norte y al sur.
Regeneración	Corros dispersos, aislados e incipientes de monte bravo, irregularmente distribuidos, más frecuentes en los extremos del cantón y menos en la parte central y superior. Podría aprovecharse de cara a la regeneración del cantón.
Problemas fitosanitarios	Bastantes tollas, especialmente hacia el 147.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias hace unos 15 años. Cortas de secos bastante recientes.
Matorral	Acebo frecuente; en las zonas encharcadas aparece majuelo abundante, rosa y pinos tapizados de hiedra. En Navarredondilla aparece mucha estepa.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª A 149
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Análogo al anterior, salvo una zona en el centro que es una losa granítica alrededor de la cual aparecen rebollos. Zonas más abiertas donde la regeneración prospera. Hay señalada una corta de verdes y de chamosos. Ataques de muérdago en las zonas bajas.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto abierto por la parte superior, más cerrado por la parte inferior, con frecuentes, densos y extensos corros de regeneración en estado de monte bravo, junto con zonas muy cerradas de masa transformada en estado de latizal bajo/monte bravo y con poco dosel de copas superior. Por la parte inferior, la regeneración es menos importante, aunque sigue estando presente como corros de regeneración en estado de repoblado/monte bravo.
Regeneración	En plena transformación, en estado de monte bravo, con zonas transformadas y zonas aún sin transformar, especialmente por abajo, donde existe un importante dosel de copas superior.
Problemas fitosanitarios	Bastantes chamosos y respaldares por la parte inferior.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias antiguas (más de 15 años) y necesidad de aclaratoria final.
Matorral	bastante acebo en la parte superior. Bastante helecho mezclado con zarza al tratarse de una ladera bastante húmeda. En las caídas al arroyo del límite con el 150 aparece rebollo y presencia de estepa.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División desocrática	2ª A 150
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Masa adulta, de buen aspecto, densa. Escasos corros de regeneración. En zonas rocosas aparecen rebollos y encinas. Algún chamoso y algún ataque de muérdago.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa de fustal alto denso y sólo con algunos corros de regeneración aislados donde existe algún hueco.
Regeneración	Sólo los corros que se originan por los huecos de cortas de secos. No hay.
Problemas fitosanitarios	Bastante muérdago y bastantes chamosos.
Tratamientos selvícolas	Corta de secos reciente, esporádicamente.
Matorral	Presencia de rebollo, rosa, retama y helecho, majuelo y acebo, pero como ejemplares aislados; en general está bastante limpio.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º B 168
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Cantón transformado hace años, aparentemente con dos clases de edad, la menor en la mitad superior, que es un latizal de medio a alto. La mitad inferior es casi fustal joven. Necesidad de claras y clareos. Algo de ataque de Ips y pinos respaldares (sobre todo en la parte baja).</i>
Clase de edad	Latizal variado con algunos fustes por arriba.
Forma y distribución de la masa	Laja de piedra bajo Navalazor con masa semiregular (fustal alto/monte.bravo) en medio de un densísimo sotobosque de brezo.
Regeneración	Masa transformada; no hay regeneración, salvo algunos corros ahogados y aislados en algún hueco.
Problemas fitosanitarios	Lajas de piedra bajo Navalazor.
Tratamientos selvícolas	Claros al lado de Navalazor, en la parte alta del cantón, posiblemente debidas a los derribos de 1996.
Matorral	No hay, solo algo de helecho. Sotobosque densísimo de brezo en la laja de Navalazor.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 169
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Masa transformada, latizal alto o fustal joven. Un raso en la Pradera de Navalazor, y al lado zona con corta diseminatoria sin resultado, y árboles padre extraordinariamente viejos. Necesidad de claras</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Laizal alto- fustal bajo regular y joven en el que se acaban de realizar claras, tal vez por los daños ocasionados por las nevadas de 1996; se trata de una clara baja, de débil a moderada, en la caída al cargadero del Hoyuelo, que a veces resulta excesiva, sobre todo en la cara de la umbría.
Regeneración	No hay regeneración, se trata de una masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Derribos ya limpios.
Tratamientos selvícolas	Clara baja moderada en la orientación este y moderada a fuerte por zonas en la cara norte. El conjunto del cantón ha quedado algo denso aún, pero aceptable.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª B 170
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Fustal viejo, más o menos denso. En la parte superior, junto al camino Smith, casi sin regeneración con pies adultos de mala calidad y aspecto de reviejos. Al bajar va aumentando tanto la calidad, como la regeneración, que llega a ser abundante en la parte baja. En la zona media hay una antigua corta a hecho, que se ensemilló y acotó.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal medio, denso, muy limpio y sin regeneración en la parte alta del cantón. En la parte media el fustal es algo más grueso. Abajo, junto al cargadero del Huerto del Tío Penizo, aparecen corros de monte bravo. Las tres cortas a hecho realizadas en este cantón están completamente regeneradas, con un regenerado muy denso, de aproximadamente un metro de altura.
Regeneración	No hay regeneración, salvo en las tres cortas a hecho.
Problemas fitosanitarios	Arriba, en la Pradera de Maravillasde un corro de <i>Ips</i> .
Tratamientos selvícolas	No ha habido arriba; solo las cortas a hecho de J.M. Sierra ya algunas cortas de secos.
Matorral	No hay. Solo algo de helecho en la parte inferior del cantón.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º B 173
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Fustal viejo que únicamente tiene regeneración muy joven y por corros en la mitad inferior.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto menos denso que el del cantón 172 en la parte alta, sin nada de regeneración y muy limpio. Abajo es similar, pero con algunos corros esporádicos , aislados, pequeños y ahogados de regeneración en estado de regenerado-monte bravo.
Regeneración	No hay en la parte superior. Abajo tampoco. salvo algunos corros aislados, pequeños y ahogados.
Problemas fitosanitarios	Algunos derribos y algo de pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Corta de derribos a la mitad del cantón, arriba, junto a la Senda Smith. Señalados algunos pies por abajo.
Matorral	No hay, salvo algún enebro ocasional.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 174
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Sigue la misma tónica que el anterior: fustal viejo sin regeneración en la mitad superior y con algo y, por corros, en la inferior. Buen aspecto fitosanitario (igual que los 170 y 173).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto y viejo, no muy denso y sin regeneración. En la parte baja se observa una cierta tendencia a la semirregularidad, debido a la presencia de corros de monte bravo y latizal, a veces ahogados por los fustes.
Regeneración	No ha prácticamente nada.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian. El suelo está encespedado.
Tratamientos selvícolas	No se observan.
Matorral	En general el cantón está bastante limpio, tan solo algo de enebro y de helecho.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Hay una lápida mortuoria en la mitad del cantón: "Rafael Díaz García-Peña. In memoriam 18 de enero de 1948 Fede"

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª B 175
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Fustal viejo, sin regeneración en la parte alta. En la zona media alternan zonas con regeneración por corros, con otras, pedregosas, en las que no hay regeneración. En la parte baja la regeneración se hace abundante e incluso hay corros que ya no tienen arbolado adulto encima, en los que la regeneración se hace pujante.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Avanzando (de noroeste a suroeste) desde Navalaviento hacia Navalazor, a media ladera: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fustal alto, claro sobre un suelo empradizado con algunos corros de regeneración aislados e incipientes de repoblado (por de Navalaviento) 2) En los alrededores de la primera vaguada, fustal bajo y denso con algún fuste grueso. 3) Desde esta vaguada a la divisoria, masa semirregular con regeneración en estado de monte bravo bajo cubierta de fustes altos y bajos, con zonas más abiertas en las que hay sotobosque de brezo, enebro y retama. 4) Antes de volver a la divisoria, latizal denso y alto; por abajo, fustal alto con corros de regeneración por arriba. 5) En la divisoria propiamente dicha, fustal alto con abundante regeneración en estado de monte bravo y a veces con restos de árboles padre. 6) En la umbría, fustal alto con frecuentes corros de regeneración ahogados bajo el dosel denso de copas de los fustes superiores, con algunos daños por derribos y una zona de fustal bajo sin regeneración.
Regeneración	Desigual por zonas (ver apartado anterior). Sería conveniente aprovecharla.
Problemas fitosanitarios	Algunos chamosos.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias/diseminatorias entre vaguada y divisoria; en general, es necesario seguir cortando.
Matorral	Enebro en la primera zona y brezo en la tercera.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 176
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Análogamente a los cantos 168 y 169, con los que formó el tramo 1 de este cuartel, es una masa transformada, latizal y fustal joven, de menor edad, e incluso clase de edad en la parte superior. Ataques de Ips, algún pie respaldar y necesidad de clareos y claras, sobre todo en el entorno de la carretera de la Reina.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En la parte baja del cantón, masa transformada de latizal alto/fustal bajo, denso, limpio y sin regeneración. Fustal alto y denso en un pequeño rincón, junto a Navalazor, con corros ahogados de regeneración. El resto, hasta abajo, fustal bajo/latizal alto sin regeneración, con algo de brezo por arriba ya junto al cantón 168.
Regeneración	No hay, salvo en un pequeño rincón junto a Navalazor.
Problemas fitosanitarios	No hay.
Tratamientos selvícolas	Claros fuertes por lo bajo en la parte media.
Matorral	No hay en la parte inferior, solo algo de brezo en la parte superior y junto al cantón 168.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 177
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>En la zona más alta regeneración, aún a la sombra del fustal, que es viejo. En la zona media pueden distinguirse tres pisos: uno, claro, de arbolado muy viejo (antiguos árboles padre); debajo de éste un segundo estrato de latizal alto e incluso fustal; y en el tercer piso regeneración profusa. En las zonas bajas regeneración muy conseguida, fustal muy claro, sobra de árboles padre y necesidad de clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	<p>Tercio superior: latizal bajo, recién pasado de monte bravo, con fustes aún abundantes por encima (más hacia el cantón 181); muy denso pero aclarado por los derribos, que son bastante abundantes..</p> <p>En la parte media tanto al noreste del cantón (pegando al 176) como en la parte suroeste (junto al 181) se encuentra un latizal alto y denso todavía con algunos fustes; algunos derribos.</p> <p>En la parte media central y en la parte inferior, la masa es fustal alto semirregular por presencia de latas y monte bravo.</p> <p>Por último, la esquina inferior noroeste, junto al cargadero del Minguete, es un latizal sin regeneración.</p> <p>En definitiva, se trata de un cantón en plena fase de regeneración o saliendo de la misma, y en la que los derribos de la nevada del 96 pueden haber dado al traste con zonas recién transformadas.</p>
Regeneración	Corros dispersos bajo fustal en la zona central media e inferior.
Problemas fitosanitarios	Derribos en latas, especialmente en la parte superior, aunque presentes por todo el cantón.
Tratamientos selvícolas	Es necesario limpiar los derribos.
Matorral	Arándano y corros de enebro y de brezo en la parte superior. Presencia de helecho por abajo
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Se ha visto un pico carpintero.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 178
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Fustal con regeneración muy escasa, incluso en la parte inferior.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, poco denso o algo claro con algunos corros de regeneración aislados, jóvenes y densos aunque incipientes en estado de repoblado-monte bravo, bastante más frecuentes en la parte superior del cantón.
Regeneración	Corros aislados, salpicados por toda la superficie, incipientes, pequeños en estado de repoblado-monte bravo. Puede estar iniciándose.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian. Suelo bastante encespado y rocoso, en general como en todo Siete Picos.
Tratamientos selvícolas	Cortas de secos o preparatorias que han podido iniciar la regeneración.
Matorral	Escaso; algo de enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 180
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>También masa muy vieja, que en parte vegeta sobre una pedriza. Regeneración muy escasa.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto y denso sin regeneración, excepto en el cuarto oeste, a partir de la vaguada y hasta el límite con el cantón 182, en el que aparecen frecuentes corros, incipientes y extendidos de repoblado-monte bravo, bajo fustal denso.
Regeneración	Solo en el cuarto oeste del cantón, desde la vaguada hasta la divisoria, en el límite con el cantón 182, en forma de corros de monte bravo, frecuentes, extendidos e incipientes bajo un fustal denso.
Problemas fitosanitarios	Derribos de arbolado grueso en tres cuartos de la parte este del cantón, aún sin retirar, aunque tronzados y deramado. Bastante pedregoso. Pedriza en la vaguada del oeste.
Tratamientos selvícolas	No ha habido; se han tronzado los derribos.
Matorral	Prácticamente no hay. Presencia de enebro y algo de helecho por abajo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª B 181
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>En la parte superior central, la pedriza, que se pasa del cantón 180 impide la regeneración bajo el fustal relativamente denso. En el resto de la parte alta hay algo de regeneración por corros. El resto, salvo algunas zonas de tollas, está con abundantes corros de repoblado y monte bravo. Es un cantón cuya regeneración puede iniciarse, en el sentido de proceder de cortas aclaratorias que pongan en luz a la regeneración existente.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón con regeneración iniciada en forma de pimpollos dispersos, aunque frecuentes bajo fustal alto y denso.
Regeneración	Iniciándose, tal vez más desarrollada desde la vaguada del oeste hasta la divisoria con el cantón 182; en forma de pimpollos dispersos en estado de monte bravo bajo el fustal.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Tal vez se han realizado cortas preparatorias o de secos, dando lugar a la abundante regeneración.
Matorral	Helecho frecuente y algo de enebro por toda la superficie; presencia de arándano y brezo en la parte este del cantón.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 182
Anterior Informe selvícola (88-89)	<i>En la parte superior, muy poca regeneración, bajo la cubierta de arbolado adulto, viejo más bien, ramoso y que vive sobre un suelo escaso.</i>
Anterior Grupo: F	<i>Parte inferior con mejor calidad de suelo y arbolado, y regeneración que progresa: repoblado, y algo de monte bravo e incluso latizal.</i>
Clase de edad	Fustal alto, poco denso y con frecuentes corros de regeneración incipiente en estado de repoblado, dispersos por toda la superficie del cantón.
Forma y distribución de la masa	
Regeneración	Iniciándose por todo el cantón en corros aislados, incipientes y frecuentes en estado de monte bravo.
Problemas fitosanitarios	Bastante pedregosidad en la parte superior.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias más o menos recientes. Necesidad de realizar cortas diseminatorias.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 183
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Con regeneración abundante por todo el cantón, incluso con alguna zona de latizal alto que precisa claras (alguna hay hecha, con podas). Tiene todavía una importante cubierta de arbolado adulto que es necesario ir eliminando mediante cortas aclaratorias. Se están cortando pinos secos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Parte inferior, al este, fustal bajo-medio denso y sin nada de regeneración, salvo algunos corros ahogados, dispersos, ocasionalmente de monte bravo. En la mitad superior, al oeste, es una masa transformada de latizal bajo, densísimo y con restos de árboles padre ocasionales sobresaliendo. Son dos zonas completamente diferentes, podrían hacerse dos cantones.
Regeneración	En la mitad este (parte inferior) no hay prácticamente nada. En la mitad oeste (parte superior) masa transformada bajo latizal bajo.
Problemas fitosanitarios	Presencia de <i>Trametes pini</i> .
Tratamientos selvícolas	Demasiado pronto para realizar cortas de regeneración en la mitad este; en la mitad oeste. son necesarios clareos en la masa transformada.
Matorral	No existe, salvo helecho bajo el fustal de la mitad este.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2° B 184
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Regeneración de distintos tipos (replado, monte bravo e incluso latizal) por todo el cantón. Cortas aclaratorias en 1986 y 1987, que deben de continuarse hasta poner en luz toda la masa joven.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada de latizal bajo que en la cara norte ha sufrido una clara mixta fuerte por los derribos de la nevada de 1996. Restos de árboles padre aún por encima.
Regeneración	No hay, masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Derribos limpios recientemente en la cara norte.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta fuerte, localmente excesiva, a veces por los derribos de la nevada del 96. La densidad existente en este cantón no está demasiado mal. Es necesario realizar clareos en la vertiente este (divisoria Casarás), ya que en esta zona no hubo derribos.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 185
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>La parte superior presenta una alternativa de regeneración bajo cubierta de fustal, que en muchos casos es un latizal que pide luz, con latizales sin cubierta. La parte baja es una pimpollada joven que va entrando en luz gracias a las cortas aclaratorias (las últimas, de 1986, 1984 y 1988).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón a dividir en dos partes: La parte superior, hasta el cambio de pendiente, es un latizal bajo y denso en el que se han hecho claras bajas y no fuertes, con masa residual de árboles padre. La parte inferior, llana, es un fustal alto con algunos corros de regeneración aislados e incipientes de repoblado.
Regeneración	No hay en la parte superior, es una masa transformada. En la parte inferior, se están iniciando algunos corros aislados de repoblado.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Claras en la parte media superior. Necesidad de cortas aclaratorias en la parte llana inferior.
Matorral	Helecho por todo el cantón. En la parte pendiente, además, con genista.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	2ª B 186
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Aunque presenta una regeneración la mayor parte del cantón, siempre bajo cubierta de fustal, hay zonas sin ninguna. Una de ellas hacia el centro del cantón bajo la carretera forestal del Puerto de la Fuenfría, y la otra junto al Arroyo Minguete. Podría empezar a consolidarse la regeneración existente mediante las oportunas cortas aclaratorias.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fuenfría: primera vaguada: fustal alto y claro por los derribos, ya limpios y con corros dispersos de monte bravo, aislados. De la primera vaguada a la segunda vaguada: fustal medio medianamente denso con corros de regenerado en estado de monte bravo aislados, aunque frecuentes y bastante limpios junto al Arroyo Minguete. Segunda vaguada: límite con el cantón 183: masa semirregular de monte bravo-latizal bajo, bajo un dosel claro de árboles padre, aunque importante.
Regeneración	Fuenfría: primera vaguada: regeneración dispersa en corros aislados de monte bravo. De la primera vaguada a la segunda vaguada: regeneración en estado de monte bravo en corros aislados, más frecuentes por abajo. Segunda vaguada: límite con el cantón 183: masa transformadas aunque con un dosel de copas importante pero claro de árboles padre.
Problemas fitosanitarios	Fuenfría: primera vaguada: limpia de derribos.
Tratamientos selvícolas	Mucho enebro; zonas empradizadas. En la segunda vaguada, límite con el cantón 183, helecho.
Matorral	
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º B 188
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>En la parte superior, hasta la calzada romana, suelo escaso, rocoso; árboles viejos y de mal porte, y muy poca regeneración. Entre la calzada romana y la carretera forestal la regeneración empieza a ser abundante bajo el fustal, que mejora de calidad. Avanzando más sigue el aumento de regeneración. Es un cantón cuya regeneración puede iniciarse en el sentido de empezar cortas aclaratorias en aquellos lugares donde hay pimpolladas pidiendo entrar en luz.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En la mitad sur, fustal alto aclarado bajo el que estaban surgiendo corros de regeneración en estado de monte bravo y que han desaparecido por las nevadas del 96. En la mitad norte, fustal alto y denso con algunos corros dispersos de regeneración bajo el dosel, aislados pero prácticamente defoliados por <i>Trametes pini</i> .
Regeneración	En la mitad sur ha desaparecido a causa de la nevada. En la mitad norte, algunos corros aislados, incipientes de monte bravo, bastante afectados por <i>Trametes pini</i> .
Problemas fitosanitarios	Bastante <i>Trametes pini</i> , tanto en gruesos como en pimpollos., que están prácticamente defoliados. Pedregosidad abundante. Mucho ganado vacuno y caballar.
Tratamientos selvícolas	Limpias de derribos en la mitad sur.
Matorral	Enebro y piorno en la mitad sur. En la mitad norte, enebro, piorno y cambrón.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2ª B 189
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: B	<i>Salvo una mínima zona en la parte más alta, en la que empieza a apuntar la regeneración, todo el cantón soporta una masa transformada que es un latizal bajo, con escasos árboles padre, localizados preferentemente a un lado y otro de la calzada romana.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada de latizal bajo sin árboles padre, mu densa y con escasos derribos.
Regeneración	No hay, es una masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Algunos derribos aún sin limpiar.
Tratamientos selvícolas	No se aprecian.
Matorral	Enebro y helecho. Presencia de piorno.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	2º B 190
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: B	<i>También como el anterior presenta una zona mínima, en lo alto de la loma, junto al convento, con regeneración incipiente. El resto, es decir caso todo el cantón, está conseguido, con mayor presencia de árboles padre, muchos de ellos señaladas para corta de 1989. Puede considerarse una cantón regenerado, con masa residual importante que hay que eliminar juntamente.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada de latizal bajo con presencia de árboles padre por encima.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Presencia de <i>D. pini</i> aunque pocas. Muchos derribos que se han limpiado y algo de pedregosidad. Presencia de excrementos seguramente de caballerías para la limpia.
Tratamientos selvícolas	Limpias de derribos. Clara mixta fuerte; en algunas zonas excesiva. Restos de corta en algunas zonas sin quemar aún.
Matorral	Enebro y piorno extendidos. Presencia de helecho y cambrón en la vaguada central.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º A 194
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>Presenta un fustal más o menos denso, viejo, con una regeneración por corros bastante repartida. Una corta en 1985. Abundan los pies chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, denso, con algunos corros de regeneración aislados y ahogados.
Regeneración	No existe, salvo los correa ahogados aislados ocasionales por huecos en el dosel.
Problemas fitosanitarios	Bastante pedregoso. Muchísimos pies chamosos.
Tratamientos selvícolas	No ha habido
Matorral	Rosales y enebro. Ya cerca de Cabeza Gatos aparece alguna mata de estepa, algunas encinas y rebollos. Cerezos junto a la carretera.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 195
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Es un fustal denso, con aspecto de masa regular. Posiblemente al haber formado parte de un antiguo tramo VI fue recorrido sucesivas veces por cortas de dominados y extracortables, lo que ha regularizado la masa y proporcionado el aspecto aludido. Ninguna regeneración. Presencia de chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, más o menos denso, con algunos corros de pimpollos en estado de monte bravo, densos y grandes aunque aislados, más frecuentes y más jóvenes por la parte inferior del cantón. Desde la divisoria hasta el arroyo que separa los cantones 195 y 200, es un latizal alto, no muy denso.
Regeneración	Corros aislados grandes y densos de monte bravo, en la parte superior; en la parte inferior, los corros son más frecuentes y más jóvenes (monte bravo/repoblado)
Problemas fitosanitarios	Muchísimos chamosos por todo el cantón, especialmente por abajo. La divisoria, hacia el cantón 200, es muy rocosa; todo el cantón es bastante pedregoso.
Tratamientos selvícolas	Corta reciente de secos por arriba. Se podría plantear la corta diseminatoria para aprovechar la fuerza de la regeneración existente.
Matorral	Helecho. Corros de enebro por arriba. Presencia de acebo y rosa. Por abajo el acebo es muy frecuente, formando incluso bosquetes. Mucha rosa y helecho por la frescura y humedad del terreno por abajo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Casi todo el cantón está removido por los jabalíes, lo que da idea de la frescura del suelo y la calidad de la estación. ! tejo en el arroyo límite del 195 con el 194.

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª A 196
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>La mitad superior es un fustal sin regeneración alguna, bastante denso. Por el contrario la mitad inferior presenta una abundantísima regeneración por corros, que algunas veces son latizales bajos más o menos liberados de la sombra del arbolado adulto. En todo caso también el arbolado adulto de la parte baja es denso.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón en plena transformación, compuesto por una masa semirregular de fustal alto más o menos abierto con frecuentes corros densos y extendidos por casi toda la superficie, en estado de monte bravo.
Regeneración	En plena transformación, en forma de corros frecuentes, densos y extensos de monte bravo, bajo cubierta de árboles padre, aún importante; más abundante en la mitad superior (cerca de la Calzada Romana) que junto a la carretera por abajo.
Problemas fitosanitarios	Algunos pies chamosos.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias hace unos 15 a 20 años. Cortas recientes de secos y en la parte SE, limpia de derribos ligera en las pimpolladas; es necesario afrontar las cortas aclaratorias.
Matorral	Sólo presencia de corros de enebro ocasionales.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Echa a correr un jabalí que estaba encamado entre los helechos. Dos buitres volando bajo hacia San Leonardo

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 197
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Prácticamente regenerado es una mezcla en mosaico de latizal bajo y monte bravo, densísimo (necesidad de clareos). Solamente una pequeña franja al lado de la carretera forestal es un fustal sin regeneración o con muy poca. También hay árboles padre que sobran, singularmente en la zona alta (incluso algún corro de fustal).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada es estado de latizal bajo y alto, más o menos mezclada. Completamente horadado por trincheras de la guerra civil, por lo que la masa más adulta debe rondar los 55 a 60 años y la más joven los 30 años: masa semirregular.
Regeneración	Masa transformada: no existe
Problemas fitosanitarios	Algunos derribos en las pimpolladas. Bastantes dominados muertos en pie
Tratamientos selvícolas	Necesidad de claras y clareos.
Matorral	No hay
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 198
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Aunque es un fustal denso, en aquellas zonas donde se hace más ralo aparece mucha regeneración, que en general está constituida por corros de latizal medio a bajo, muy densos. Tiene bastante madera.</i> <i>En la parte alta, la antigua zona de trincheras de la guerra civil está completamente regenerada.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Hasta la divisoria del 205 y 203 es un fustal viejo alto, poco denso, sobre terreno pedregoso, sin regeneración. Apartir de la divisoria, más denso con corros de monte bravo, aislados.
Regeneración	No hay salvo a partir de la divisoria del 205/203 hacia el norte, en donde aparecen algunos corros de monte bravo dispersos
Problemas fitosanitarios	Muy pedregoso.
Tratamientos selvícolas	No ha habido, salvo cortas preparatorias en la mitad norte
Matorral	Piomo y enebro abundantes en la parte superior.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 199
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Es un fustal de buena calidad, denso, bajo el que alternan zonas sin regeneración, con otras algo abiertas, en las que se dan corros de pimpolladas que son latizal bajo (zona superior) o latizal medio (zona inferior). Chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, poco denso, con frecuentes corros de regeneración en estado de monte bravo ahogados, más abundantes al norte del cantón
Regeneración	Frecuentes corros de monte bravo densos aunque aislados, iniciados por cortas preparatorias intensas, más que por cortas diseminatorias; más frecuentes al norte del cantón que al sur.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias, probablemente de secos realizadas hace unos 15 años; necesidad de aprovechar la fuerza de la regeneración existente, realizando diseminatorias.
Matorral	Solo presencia de helecho y enebro; algún acebo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 200
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Este cantón, al igual que los 201, 202 y 204, con los que formaba el tramo 1 de este cuartel, es una masa transformada. Es un fustal joven, con algún bosque de viejo que no se transformó en su día. No tiene, consecuentemente, regeneración. Es este cantón se ensayaron hace cuatro o cinco años (como en otros ya reseñados), cortas hecho por bosquetes de aproximadamente 0,5 ha. Los tres de este cantón no se han regenerado, pese a la ayuda a la regeneración prestada (laboreo del suelo) e incluso a la siembra de piñón. Aunque su orientación de umbría podría hacer pensar en el éxito del tratamiento, esto no ha sido así. Se piensa que en todas las orientaciones se precisa la protección del arbolado adulto. El aclareo sucesivo debe de ser el tratamiento de cortas de reproducción a emplear.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Como los cantones 201 y 202: masa transformada, en estado de fustal bajo, de buena calidad de estación (buena altura) aunque de mala calidad tecnológica (muy ramosos). Muy densa, limpia y sin regeneración por debajo. Los tres bosquetes de la corta a hecho se encuentran perfectamente regenerados y poblados por un espeso monte bravo/repoblado.
Regeneración	No hay; masa transformada de unos 80 años.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Claras recientes, que han disminuido la densidad; siguen siendo necesarias más claras.
Matorral	Sólo helecho de poca potencia. Algún acebo
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 201
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Transformado, es un fustal joven. En 1988 se ha hecho una corta de dominados. Sin regeneración joven.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada, en estado de fustal bajo. Muy densa, limpia y sin regeneración por debajo
Regeneración	No hay: masa transformada.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian.
Tratamientos selvícolas	Claros recientes; hay que aclarar aún más (masa muy densa)
Matorral	No hay. excepto helecho de poca potencia.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª A 202
Anterior Informe selvícola (88-89)	Igual que el anterior, también con corta de dominados en 1988.
Anterior Grupo: A	
Clase de edad	Como los dos anteriores: masa transformada, en estado de fustal bajo muy densa,
Forma y distribución de la masa	limpia y sin regeneración por debajo
Regeneración	No hay: masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Algunos pies chamosos (poca cosa)
Tratamientos selvícolas	Claros, algunas por los derribos de la nevada del 96, que descabezaron algunos pies. Masa muy densa que hay que aclarar.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 203
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Con algo de regeneración por corros, y muy joven en la zona superior, en la inferior necesita cortas de dominados, es decir, cortas preparatorias. Mala calidad.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto junto al cantón 205 y latizal alto/fustal bajo conforme se avanza hacia el 199, denso, limpio y sin regeneración, excepto un par de corros de repoblado que aparecen aislados.
Regeneración	No hay, excepto un par de corros amplios en estado de repoblado, aislados
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Corta de secos y derribos este año 1998
Matorral	Algún corro de enebro y ejemplares de acebo dispersos.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 204
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Análogo a los 200, 201, 202; con corta de dominados en 1988.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal bajo muy denso, limpio y sin regeneración
Regeneración	No hay: masa transformada
Problemas fitosanitarios	Algunos respaldares. Arbolado muy ramoso
Tratamientos selvícolas	Claros recientes (entre 1996 y 1997) y limpia de los descabezados por la nevada del 96
Matorral	Helecho de poca potencia; presencia de acebo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º A 205
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>Aunque es un fustal bastante denso, presenta una regeneración abundante aunque desigualmente repartida. Zonas con regeneración joven, otras sin regeneración y otras con latizales que precisan clareos.</i> <i>Se considera un cantón cuya regeneración podría iniciarse, en el bino entendido de iniciar cortas aclaratorias que pongan en luz la regeneración conseguida y que también se ejecutan cortas preparatorias pues hay zonas con dominados y puntisecos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cantón que se podría dividir en 2: desde el 208 hasta la 1ª vaguada es una masa clara, abierta en su día por cortas de regeneración, en la que los derribos de la nevada del 96 han provocado la práctica desaparición de toda la regeneración que existía. Esa parte debería acotarse ya que ha quedado poca masa y el suelo es muy pedregoso. Los restos de corta siguen en el suelo, aunque se ha limpiado todo el desastre. El resto es una masa semirregular de fustal medio y latizal alto, estando éste concentrado en la mitad inferior, muy denso; sólo hay regeneración en corros aislados y pequeños cerca de la Calzada Romana
Regeneración	No hay, excepto unos pequeños corros aislados junto a la Calzada Romana
Problemas fitosanitarios	Muchos derribos apartir de la vaguada del sur del cantón hacia el 208, ya retirados aunque quedan los restos de la corta en el suelo.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de acotar el tercio sur, desde la vaguada hacia el 208, por la escasez de suelo y la poca masa que ha quedado en pie.
Matorral	Algo de enebro en el tercio sur del cantón; el resto está bastante limpio
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	1 corzo

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 206
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Fustal joven, transformado, con necesidad de corta de dominados.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto denso limpio y sin regeneración
Regeneración	No hay. salvo los corros pequeños aislados producidos por huecos en el dosel
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Corta de secos, esporádicamente
Matorral	Helecho poco potente, con acebo frecuente
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 207
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Fustal denso, aunque hay corros de latizal alto. En estos y en aquel, hay necesidad de cortas de dominado. Pocos corros de regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, denso, limpio, sin nada de regeneración
Regeneración	No hay, excepto los corros que se producen por derribos y huecos en el dose de copas superior.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian. Una tolla excepcionalmente extensa en la mitad inferiro al norte del cantón
Tratamientos selvícolas	Sólo corta ocasional de secos.
Matorral	Helecho de poca potencia con frecuentes acebos; un par de tejos cerca del 206.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 208
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Regeneración por corros, latizal bajo y monte bravo, bajo un fustal aún denso.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa de fustal medio, excesivamente clara debido a los derribos de la nevada del 96, sobre suelo muy pedregoso. La regeneración que había ha desaparecido por completo y aunque queda masa, hay que acotarlo.
Regeneración	Ya no existe al haber desaparecido por la nevada del 96
Problemas fitosanitarios	Muchos derribos ya limpios; muy pedregoso
Tratamientos selvícolas	Retirados los derribos y los restos de corta; es un canton que hay que acotar y vallar para asegurar su regeneración, puesto que el suelo es escaso y queda una masa de fustal medio muy clara
Matorral	No hay salvo helecho de poca potencia; presencia de retama.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 209
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Poca regeneración, y la poca que hay por corros que abundan un poco más en la confluencia de la calzada romana y la carretera forestal. Fustal denso.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto denso sin más regeneración que la que aparece en la confluencia de la pista forestal y la Calzada Romana
Regeneración	Sólo en la confluencia de la pista y la Calzada Romana, como un corro denso de monte bravo
Problemas fitosanitarios	La pradería que está reflejada en la cartografía en realidad es una tolla.
Tratamientos selvícolas	No ha habido
Matorral	No hay; muy limpio
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	1 corza

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 210
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Bastante regeneración, densa y joven, por toda la superficie; pero queda bajo un fustal no excesivamente aclarado. Una corta en 1987. En la parte alta la regeneración es menos abundante que en el resto.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto menos denso, por cortas de mejora, que sólo presenta latas junto al 212 (bastante dañadas por la nevada de 1996). Del cambio de orientación hacia el 211, la masa cambia pasando a ser fustal alto claro con abundante regeneración en estado de monte bravo/latizal bajo. También aparece algún corro de regeneración, grande aunque aislado en la parte central. Hay un corro importante en la parte inferior junto a la Calzada Romana.
Regeneración	Solo a partir de la divisoria hacia el 211 (norte), por corros densos en estado de monte bravo/latizal bajo. En el resto, algunos corros densos grandes pero aislados de latizal/monte bravo.
Problemas fitosanitarios	Derribos en las latas cerca del 212. Pedregoso en la divisoria. Bastante empradizado. Hay 3 ó 4 tollas grandes.
Tratamientos selvícolas	Cortas de secos, abundantes tocones gruesos en la parte central. A falta de limpiar los derribos cerca del 212.
Matorral	Limpio todo el cantón, excepto hacia el 211, en que aparece enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	2 corzos, 1 águila

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 211
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Prácticamente conseguido, es un monte bravo y latizal, bajo un fustal claro, que precisa, por zonas, corta de árboles padre, y/o últimas aclaratorias.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa de latizal bajo/monte bravo, muy denso, con resto de árboles padre por encima, muy pocos, y que se podría liquidar si en un momento dado se necesitara madera
Regeneración	Cantón transformado
Problemas fitosanitarios	Muchísimos derribos, aún sin limpiar, en los latizales. Sería fácil hacerlo por la trocha que atraviesa el cantón.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de limpiar los derribos que van a provocar, como siempre, una clara mixta, fuerte e irregular. Podría acometerse la corta aclaratoria final.
Matorral	Algunos golpes de enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 212
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: F	<i>Bastante regeneración bajo un fustal muy denso de mala calidad. Necesidad de empezar cortas preparatorias (hay mucho dominado) y aclaratorias.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto denso con latizal disperso bajo el dosel de copas superior
Regeneración	Latizales avanzados, con algunos daños por las nevadas, ya limpios
Problemas fitosanitarios	Ha habido derribos importantes, ya retirados.
Tratamientos selvícolas	Clara fuerte, mixta e irregular por zonas debido a los derribos provocados por la nevada del 96.
Matorral	Algunos golpes de enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3º A 213
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal aclarado (la última corta fue hace dos años) con regeneración joven y densa por casi todo el cantón.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular de latizal bajo con dosel aún importante de árboles padre que se podrían eliminar.
Regeneración	Masa en plena transformación, a falta de cortas aclaratorias.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos en las latas
Tratamientos selvícolas	Limpieza y quema de restos de la clara de los derribos (mixta y de moderada a fuerte)
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª A 214
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Regeneración muy abundante bajo un fustal claro. No obstante hay zonas que precisarían de cortas aclaratorias par poner en luz las pimpolladas.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Arriba, latizal con ligerísima tendencia a la semirregularidad por la presencia de masa residual de árboles padre en la mitad oeste del cantón; ha quedado muy dañado por las nevadas del 96, siendo en algunas zonas un latizal claro con algunos fustes por encima. En la mitad este, masa transformada en estado de latizal prácticamente sin árboles padre. Abajo, latizal alto aclarado por la nevada de 1996.
Regeneración	No hay. Masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Derribos en la parte superior aún sin limpiar en la mitad oeste y ya limpios hacia el cantón 218. Derribos abundantes también en la parte inferior.
Tratamientos selvícolas	Claras mixtas y fuertes por los derribos de la nevada de 1996 en la parte alta, en la mitad este (hacia el cantón 218); sin realizar aún en la mitad oeste. También por abajo, aunque ya se han retirado los fustes caídos, quedando solo los restos de corta en el suelo. Menos importantes por abajo. Solo quedan derribos sin retirar ni tronzar en las caídas al arroyo con el cantón 222.
Matorral	Enebro bastante frecuente en la parte alta. No hay abajo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º A 215
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Análogo al anterior, salvo una zona de pedriza en la parte superior, que no tiene regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Era un cantón, como el 214, prácticamente regenerado, con restos de árboles padre, pero que ha quedado muy dañado por las nevadas del 96. Actualmente es un latizal alto, muy claro a veces, incluso con algunos rasos, y con pocos fustes gruesos.
Regeneración	Ya no hay, tras los desastres de la nevada del 96.
Problemas fitosanitarios	Abundantísimos derribos, aún sin recoger en la parte alta, junto a los corrales de la Majada Pascual, y ya limpios por la parte inferior. Muy pedregoso.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta fortísima (excesiva) en la parte baja y va a ser lo mismo por la parte alta en cuanto se retiren los daños de la nevada. Hay que terminar de limpiarlo y será necesario acotar y vallar para que se logre la regeneración en un lapso prolongado de tiempo, debido a la escasez de masa que ha quedado, los grandes rasos que se empradizarán y la elevada pedregosidad del cantón.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 216
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Con regeneración por todo el cantón, salvo en su zona central, abierta y con muy poca regeneración. Tiene bastante madera y hay una corta importante señalada para 1989.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En los dos tercios superiores, latizal denso con algunos árboles padre diseminados. En el tercio superior, fustal alto y claro con abundante regeneración diseminada por abajo.
Regeneración	En los dos tercios superiores, regeneración abundante de una cuarta de altura en la zona afectada por el incendio de 1995. En el tercio superior, regeneración abundante bajo fustal aún denso de árboles padre.
Problemas fitosanitarios	Algunos derribos por abajo aún sin limpiar. <i>Trametes pini</i> en el tercio superior, principalmente en los pimpollos. Bastante pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	No ha habido. Es necesario terminar las cortas aclaratorias arriba.
Matorral	Piorno abundante y enebro, principalmente por arriba.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª A 217
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Casi conseguido, pero todavía con zonas de fustal viejo. La masa transformada pertenece a dos claras de edad: una es un latizal alto, con necesidad de claras, otra es monte bravo y latizal bajo con necesidad de clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto no muy denso con tendencia a la semirrregularidad por presencia de latas dispersas.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Derribos tronzados pero sin retirar junto al Arroyo de la Majada del Regajo (anterior al Rfo de la Acebeda, avanzando hacia el 207)
Tratamientos selvícolas	Cortas de derribos de la nevada del 96, aún sin retirar junto al Arroyo de la Majada del Regajo.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º A 218
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Regeneración por corros, abundante; algún corro de latizal que necesita clareos y claras. Queda bastante fustal sobre las zonas regeneradas (que es preciso eliminar mediante cortas aclaratorias) e incluso corros de fustal que precisan diseminatorias. Necesidad de eliminar restos de cortas antiguas.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En el rincón superior, hacia el cantón 220, fustal alto no muy denso con algo de regeneración dispersa. En la parte media-alta, latizal bajo aclarado fuertemente por la nevada de 1996. (ver Trat. Selvícolas); aún quedan algunos fustes de árboles padre. En la vertiente al este, masa bastante densa de latizal sin derribos. Similar abajo pero con menos derribos.
Regeneración	No hay: se trata de una masa transformada .
Problemas fitosanitarios	Abundantes derribos por la nevada de 1996, que han dejado el latizal bastante abierto por la parte superior. Por abajo los derribos son menores.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta, fuerte, a veces muy fuerte, en el suelo aún, pero tronzada, desramada y apilada, ya preparada para la saca.
Matorral	Presencia de enebro en la parte superior; nada por abajo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Se ha oído ladrar un corzo.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 219
Anterior Informe selvícola (88-89)	<i>Prácticamente conseguida la regeneración, a falta de las últimas aclaratorias.</i>
Anterior Grupo: C	<i>Algún pequeño raso en la zona superior. La regeneración es densa y joven.</i>
Clase de edad	<i>Necesidad de limpieza de restos de corta.</i>
Forma y distribución de la masa	Latizal con una ligera tendencia a la semirregularidad por presencia de masa residual de árboles padre en la mitad oeste del cantón; en la mitad este es una masa transformada en estado de latizal prácticamente sin árboles padre.
Regeneración	Masa transformada: no hay
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos, por todo el cantón, sin limpiar en la mitad oeste, limpios hacia el 218.
Tratamientos selvícolas	Claras mixtas fuertes por los derribos del 96, sin realizar aún hacia el oeste y realizadas hacia el 218. Quedan por retirar ahí los restos de corta, que están extendidos por el suelo.
Matorral	Solo enebro abundante en la parte superior
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª A 222
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal aclarado, que presenta poca regeneración en la parte alta, en corros. Claros cubiertos por piorno, sin regeneración. La parte baja con aumento de la regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa con tendencia a la semirregularidad por ser un latizal bajo y monte bravo con masa residual de árboles padre por la parte superior. En la ladera situada más al oeste, hacia el cantón 219, hay una extensa zona vallada con abundantes pímollos sueltos. En esta ladera, la masa está más avanzada (latizal alto). En la parte superior, el estado de fustal es más abundante que en el resto del cantón.
Regeneración	No hay, es una masa transformada.
Problemas fitosanitarios	Derribos en la ladera que da al cantón 219. Pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	No ha habido; no parecen necesarios.
Matorral	Enebro y piorno por todo el cantón, donde la masa está más abierta.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3° A 224
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Parte alta con poca regeneración bajo arbolado viejo y más o menos claro. La parte baja, por el contrario, tiene bastante regeneración, también bajo fustal claro.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto y viejo en la parte alta, ramoso y de baja calidad, mezclado con latas bastante dañadas por la nevada de 1996.
Regeneración	Arriba no existe.
Problemas fitosanitarios	Derribos de latas en la parte superior. Pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Arriba no ha habido.
Matorral	Piorno y enebro en la parte superior.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º B 225
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal claro con una regeneración por todo el cantón. Necesidad de clareo en alguna pimpollada. Chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Latizal denso con frecuentes fustes de árboles padre aún presentes por zonas
Regeneración	Algunos corros entre los latizales; presencia ocasional
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	No se aprecian
Matorral	Presencia de acebo, rosa y enebro
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 226
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>En parte es un latizal con necesidad de claras. El resto fustal con regeneración abundantísima, que necesita ponerse en luz. Corta señalada para 1989. Hay chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Por encima de la trocha intermedia es un fustal alto claro con abundantes corros de regeneración. Al oeste del cantón hay una tolla importante, y entre la tolla y la pista límite con el 237 hay abundante acebo. Por debajo de la trocha es un latizal muy denso sin árboles padre, cerrado, en el que se han realizado claras.
Regeneración	Por encima de la trocha hay corros frecuentes aislados en estado de monte bravo bajo fustal denso de árboles padre. En plena transformación. Por debajo no hay, al ser una masa transformada.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Claras en la parte inferior, por lo bajo y moderadas. Se podría afrontar la corta aclaratoria en la parte superior.
Matorral	Mucho acebo en la parte superior. Por abajo hay acebo frecuente, cerezos dispersos y un tejo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º B 227
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal abierto en los límites del cantón, donde aparece regeneración. El centro es fustal cerrado sin regeneración. Necesidad de clareos en los latizales bajos conseguidos. Acebo abundante.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	L aparte norte del cantón, entre la divisoria que hbaja desde Navaltestero hasta el Vado de Arrastraderos, y un pequeño cambio de pendiente es un latizal denso, cerrado de copas, con algunos árboles padre sobresaliendo, que se han cortado en parte durante 1998. El resto es un fustal alto denso con un sotobosque densísimo, a veces impenetrable, de acebo en estado de monte bravo, no muy desarrollado.
Regeneración	Sólo en la parte inferior cerca del Vado de Arrastraderos
Problemas fitosanitarios	Muchísimo pino con hiedra
Tratamientos selvícolas	Corta aclaratoria en la parte inferior cerca del Vado de Arrastraderos. Se podría plantear un programa de resalveos para desarrollo del monte bajo de acebo.
Matorral	Acebo abundantísimo por toda la superficie, excepto en la parte inferior cerca de la divisoria y hacia el Vado. Es densísimo, de aproximadamente 1,5 m de altura, a veces impenetrable. En el cantón se ven, además, ejemplares de tejo, serbal, cerezo, zarza, majuelo rosa y arraclán.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª B 228
Anterior Informe selvícola (88-89)	<i>Masa transformada, fustal joven. Con abundantísimo acebo como sotobosque. Necesidad de claras (casi cortas preparatorias) sin regeneración, lógicamente.</i>
Anterior Grupo: A	
Clase de edad	Fustal medio denso, sin regeneración y con abundante sotobosque avanzado de acebo (se ven incluso algunos latizales de acebo) que tapiza prácticamente toda la superficie.
Forma y distribución de la masa	
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	Se aprecian bastantes árboles chamosos.
Tratamientos selvícolas	Se podrían plantear resalveos sobre el monte bajo de acebo combinados con cortas de mejora sobre el pinar para liberar y desarrollar la acebeda.
Matorral	Abundantísimo acebo por toda la superficie, denso y avanzado, con presencia de latizales de acebo. De cara a la regeneración del pinar podría ser un problema.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 229
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Análogo al anterior, con menos acebo.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto y denso sin regeneración con sotobosque importante de acebo.
Regeneración	No hay.
Problemas fitosanitarios	La pradera que está refelejada en la cartografía no está, sino un gran tolla. Se aprecian bastantes pinos respaldares.
Tratamientos selvícolas	No ha habido. Lo mismo que en 227 y 228 se podría plantear un programa de resalvos muy ligeros en el monte bajo de acebo combinados con una corta de mejora sobre el pinar para liberarlo y desarrollarlo.
Matorral	Acebo importante en golpes y bosquetes densos. Hiedra cerca del 228 sobre los pinos.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 230
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: A	<i>Análogo a los dos anteriores. Dos bosquetes de corta a hecho, de 0,5 ha, realizados en 1984/85 sin ningún resultado.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto denso sin regeneración. Hay dos bosquetes de corta a hecho realizados por J.M. Sierra que están actualmente ocupados por repoblado incipiente.
Regeneración	Sólo en los dos bosquetes de corta a hecho, en estado de repoblado. En el resto no hay. Los dos bosquetes, además, presentan muchísima retama y helecho.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	No ha habido
Matorral	Presencia de acebo. Helecho por toda la superficie de poca potencia.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 231
Anterior Informe selvícola (88-89)	<i>Prácticamente se puede considerar un cantón transformado, muy espeso, aunque con algún relicto de la masa anterior. Algún corro, muy aislado de regeneración.</i>
Anterior Grupo: A	<i>Necesidad de claras, que prácticamente tendría carácter de cortas preparatorias.</i>
Clase de edad	Fustal medio y alto, sin regeneración, muy denso y de gran altura.
Forma y distribución de la masa	
Regeneración	No hay
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Corta de secos esporádicamente.
Matorral	Helecho de poca potencia. Presencia de acebo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 232
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal claro en la parte superior, sobre una pedriza, y con escasa regeneración. La mitad inferior es un fustal aclarado, con bastante regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa en transformación, casi lograda, con dosel de árboles padre aún importante, con daños por la nevada de 1996 hacia la parte inferior y con <i>Diprion pini</i> en la superior..
Regeneración	Masa transformada a falta de la corta aclaratoria final
Problemas fitosanitarios	Abundantes daños por <i>Diprion pini</i> en las pimpolladas superiores; abundantes derribos aún sin limpiar por la parte inferior. Muy pedregoso, con el Canchal de Cereceda en medio del cantón.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de limpiar los derribos, Necesidad de realizar la corta aclaratoria final con prudencia por la escasez de suelo y por los abundantes derribos. Tal vez, ni hacerla.
Matorral	Piorno y enebro.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 233
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal aclarado, con regeneración abundante. Necesita limpieza de restos de corta y clareos (en la parte baja).</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular, o con tendencia a, de latizal, a veces monte bravo, con dosel de árboles padre aún por encima, con bastantes daños en las pimpolladas, aún sin limpiar.
Regeneración	Masa transformada: no existe.
Problemas fitosanitarios	Abundantes derribos por la nevada de 1996. Bastante pedregoso.
Tratamientos selvícolas	Cortas diseminatorias e incluso alguna aclaratoria de unos 20 años. Necesidad de limpiar los derribos (será un clara mixta, moderada e irregular por zonas)
Matorral	Piorno más o menos abundante.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 234
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Masa de fustal desigualmente abierta y consecuentemente con distintos resultados en cuanto a regeneración: hay zonas en las que es abundante y otras en la que escasea. Necesidad de seguir con las cortas aclaratorias y practicar diseminatorias en las zonas no abiertas.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal claro abierto con frecuentes corros, extensos, densos y abundantes, en estado de monte bravo a latizal, con algunos daños por la nevada de 1996, a la espera de cortas aclaratorias.
Regeneración	Muy extendida, desarrollada, abundante, como monte bravo/latizal, por debajo de un fustal aún importante y por toda la superficie.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos, aún sin limpiar. Presencia, poca, de <i>Diprion pini</i> , y algo de <i>Blastophagus piniperda</i> , aunque no preocupante pero presente. Bastante pedregoso y rocoso.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de afrontar las limpieas de los derribos (clara baja, en este caso, moderada) y necesidad de afrontar las cortas aclaratorias.
Matorral	Algo de retama y enebro, poco importantes.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º B 235
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>En parte transformado, o quizás regularizado, es un fustal con aspecto joven con escasos corros de regeneración. Buena calidad.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Cerca del límite entre 234 y 235 es un fustal alto denso con pimpollos sueltos ahogados y dispersos. Luego pasa a ser un latizal a monte bravo muy denso con fustes aislados de árboles padre aún por encima, bastante dañados por la nevada de 1996
Regeneración	La mitad norte es una masa transformada, la mitad sur es un fustal alto a medio, denso, sin regeneración, excepto por los pimpollos sueltos aislados y ahogados que se ven ocasionalmente.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos, que hay que limpiar. Algo pedregoso.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de realizar limpieza de los derribos (clara mixta, fuerte a veces, irregular por zonas).
Matorral	Prácticamente no hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 236
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Fustal aclarado, con regeneración abundantísima.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada de latizal densísimo, sin árboles padre. Por la parte inferior parece algo más adulta que por la superior, pero es un cantón bastante regular.
Regeneración	Cantón transformado.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian, salvo algún derribo ocasional.
Tratamientos selvícolas	Limpieza de los derribos escasos que hay cerca de Navalpotro.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 237
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>En la parte alta domina un latizal, consecuencia de cortas de aclareo practicada en su día, prácticamente sin arbolado adulto. Necesidad urgente de clareos. En las partes media y baja, predomina el fustal más o menos abierto, con diferentes resultados en cuanto a regeneración, siempre por corros. Cierta abundancia de chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	<p>Es un cantón a dividir, claramente, en dos o incluso en tres. A partir del nuevo camino del Cerrillo, se divide en dos cantones, para arriba y para abajo. El de abajo, a su vez, en la parte oeste y el extremo este hacia el 236.</p> <p>Del camino del Cerrillo para arriba: era una masa transformada, casi sin árboles padre, que ha quedado muy rala tras los desastres de las nevadas de enero del 96. Por encima de un carril que va de Navahermosa al Morro de los Arrancados ha quedado francamente ralo, estando la superficie limpia y retirados los palos caídos. Quedarán del orden de 150 a 200 pies por hectárea, con un diámetro medio de 12 a 15 cm. Entre este carril y el camino del Cerrillo los daños han sido intensos pero menos que por arriba. Se podría decir que la parte superior es una clara mixta excesiva y regular en toda la superficie, mientras que entre ambos caminos la clara es mixta, muy fuerte e irregular por zonas. En esta zona entre caminos habrán quedado entre 375 a 500 pies por hectárea, de las mismas dimensiones que por arriba. Se están retirando (noviembre de 1998) en esta zona entre caminos los palos, ya tronizados.</p> <p>Del camino del Cerrillo para abajo: es claramente irregular puesto que presenta zonas de fustal alto abierto con abundante regeneración extendida por toda la superficie en estado de monte bravo, junto a zonas de fustal alto más denso con regeneración abundante en corros densos y extendidos de repoblado. Hacia la divisoria con el cantón 236 en la parte este del cantón, la masa pasa a ser predominantemente de latizal denso con zonas de fustes intermedios. Los daños por debajo del camino del Cerrillo han sido esporádicos, menos frecuentes cuanto más abajo se desciende por la ladera. Son abundantes en una franja de unos 20 a 40 metros por debajo del Camino del Cerrillo.</p>
Regeneración	Ver apartado anterior
Problemas fitosanitarios	Ver apartado de forma y distribución de masa. Algunas tollas en la parte por debajo del camino del Cerrillo. Todo el 237 es bastante pedregoso.
Tratamientos selvícolas	Ver apartado de distribución de masa. La parte superior hay que cercarla, porque puede empradizarse y tener problemas de cara a su persistencia si hubiese temporales. No hay que tocarlo en la parte superior con más cortas.
Matorral	En la parte inferior hay presencia de sauce, acebo y cerezos.
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	! pito real y 1 buitre que levanta el vuelo por la parte superior.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 238
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Fustal relativamente abierto, con regeneración que abunda. En algunos corros necesidad de clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada en estado de monte bravo a latizal bajo entre la que sobresalen algunos fustes de árboles padre.
Regeneración	No hay: masa transformada
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Necesidad de acometer clareos.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 239
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Análogo al anterior, quizá masa más cerrada. Regeneración por corros. Algunas pimpolladas importantes que precisan clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto, medianamente denso, con latizales bajos/monte bravo en forma de ejemplares dispersos por toda la superficie, aún no ahogados. Del arranque del camino del Cerrillo, la masa es más latizal con menos árboles padre.
Regeneración	Iniciada pero antigua; se podría aprovechar.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Necesidad, tal vez, de acometer la aclaratoria.
Matorral	Presencia de enebro, helecho y acebos.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 240
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Fustal con regeneración relativamente abundante y joven.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular de latizal alto abierto con muy abundantes corros de regeneración, bastante avanzada, en estado de monte bravo tendiendo a latizal, a veces ahogados.
Regeneración	Muchos corros extensos abundantes y densos, avanzados, de monte bravo/latizal bajo. a veces ahogados
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Necesidad de aclaratoria final
Matorral	No hay
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 241
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Aspecto de fustal claro, con regeneración que progresa. Cierta frecuencia de chamosos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular de monte bravo/latizal bajo con presencia de fustal alto, en general bastante claro, aunque con zonas donde es más espeso. Es necesario hacer la aclaratoria final.
Regeneración	Masa transformada, en general.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian. Algunos derribos (clareos) cerca de Navahermosa
Tratamientos selvícolas	Cortas A.S.U. hace unos 20 años; necesidad de clareos en algunas zonas y necesidad de aclaratoria final
Matorral	No hay
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3° B 242
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal bastante aclarado y con una regeneración muy avanzada. La parte superior cortada (últimas aclaratorias) en 1987, aunque aún queda madera. La parte baja está más cerrada, pero también con regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Recorriendo el cantón de abajo hacia arriba, aparece un latizal alto con fustes; continua una zona de fustes casi sin regeneración y luego un latizal bajo, hasta el Collado del Río Peces, con un dosel aún importante de árboles padre. Arriba, abundantes derribos en las latas.
Regeneración	No hay
Problemas fitosanitarios	Abundantes derribos en las latas, aún sin limpiar, en la parte superior.
Tratamientos selvícolas	No se aprecian
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª B 243
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: G	<i>Masa de fustal cerrado, que se va abriendo por sus límites, con presencia de regeneración. El centro con poca regeneración.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa semirregular de fustal alto con latizales dispersos; recorriendo el cantón de abajo (Navahermosa) hacia arriba (Collado de Río Peces) se encuentran las siguientes masas: en la parte inferior, latizal bajo; continuando hacia arriba, monte bravo y luego, latizal alto, casi sin fustes; cerca del Collado de Río Peces, latizal bajo de nuevo, con un dosel de árboles padre. En la parte inferior, junto al arroyo límite con el cantón 244, quedan aún bastantes fustes que van ahogando a la regeneración (latizal bajo-monte bravo); sería necesario hacer la corta aclaratoria final.
Regeneración	Masa transformada con dosel de fustes aún importante, excepto en la parte baja, junto al arroyo límite con el cantón 244, en donde se tiene abundante regeneración de monte bravo, ahogada por una masa aún densa de fustal alto.
Problemas fitosanitarios	Cerca del collado, muchos derribos en las latas, aún sin limpiar, aunque existen también derribos por todo el cantón
Tratamientos selvícolas	Necesario realizar la corta aclaratoria final.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

División dasocrática	3ª B 244
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: B	<i>Regeneración prácticamente conseguida a falta de cortar árboles padre, que empiezan a sobrar, y practicar las últimas cortas aclaratorias en las escasas zonas menos abiertas. Necesidad de clareos, claras y eliminación de restos de corta. La masa transformada es un latizal de medio a alto.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	En la parte alta, masa transformada de latizal con resto de árboles padre. No es conveniente realizar la corta final, ya que podría ponerse en peligro la persistencia del monte. Falta por limpiar todavía la parte alta y los latizales han quedado bastante dañados. En la parte baja, latizal alto sin fustes, bastante densos; se han limpiadolos derribos, habiendo resultado clara mixta o baja-moderad, habiendo quedado bastante bien.
Regeneración	Corros de regeneración extendidos en estado de monte bravo y algunos pies en estado de latizal en la parte baja.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos, tanto en la parte alta como en la parte baja del cantón, aún sin sacar pero ya tronizados y apilados. Pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta, fuerte e irregular por los derribos. En la parte baja, clara mixta o baja-moderada.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º B 245
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: B	<i>Salvo la Cancha del Río Peces, todo el cantón está regenerado y transformado, con una masa residual algo más importante que la del cantón anterior.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada de latizal con resto de árboles padre; tal vez podría hacerse la corta aclaratoria final. En la parte baja, fustal alto con corros de regeneración extendidos en estado de monte bravo y algunos pies en estado de latizal.
Regeneración	Corros de regeneración extendidos en estado de monte bravo y algunos pies en estado de latizal en la parte baja.
Problemas fitosanitarios	Bastantes derribos, tanto en la parte alta como en la parte baja del cantón, aún sin sacar pero ya tronizados y apilados. Pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Clara mixta, fuerte e irregular por los derribos. Parece que pudiera hacerse ya la corta final.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 246
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Cortas en 1987, necesidad de limpiar restos. Regeneración bastante abundante pero sin llegar a la de los cantones 244 y 245. En algunas zonas la regeneración es aún muy joven y necesita protección del arbolado adulto. En otras zonas requiere, como en los mencionados cantones, corta de árboles padre. Más madera que en los dos anteriores.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Fustal alto con frecuentes corros de regeneración en estado de monte bravo-latizal y algunos bosquetes de latizal. Abajo, masa transformada de latizal alto-fustal bajo sin regeneración, excepto una pequeña zona de fustal con corros de regeneración y abundante monte bravo.
Regeneración	Regeneración iniciada por cortas preparatorias hace unos 15 años. En la parte inferior corros de regeneración y abundante monte bravo.
Problemas fitosanitarios	No se observan. Poco suelo y algo de pedregosidad.
Tratamientos selvícolas	Cortas preparatorias hace unos 15 años. Necesidad de realizar corta aclaratoria final.
Matorral	Prácticamente inexistente.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3º B 247
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>Fustal todavía bastante cerrado, pero con regeneración abundante. En la zona baja necesidad de clareos y corta de árboles padre.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa en plena transformación con mas regeneración y menos árboles padre por arriba (donde está completamente transformado, siendo un latizal bajo denso con necesidad de clareos) y menos regeneración y más fustales por abajo, siendo por abajo masa semirregular por presencia del abundante dosel de fustes que sobresalen por encima.
Regeneración	Muy abundante. Transformado por arriba (latizal bajo denso); en el resto: corros abundantes y extendidos por toda la superficie bajo dosel importante de árboles padre.
Problemas fitosanitarios	Algunos derribos cerca del 243 junto a Navahermosa. Algo pedregoso por abajo. Algunos pies chamosos.
Tratamientos selvícolas	Necesidad de clareos por encima; necesidad de corta aclaratoria por abajo.
Matorral	No hay.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 248
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: E	<i>La parte alta puede considerarse conseguida, con masa residual que habría que ir eliminando. Únicamente en esta zona alta hay un raso consecuencia de un derribo por viento que agrandó el bosque de 0,5 ha que se cortó a hecho en 1984/85. En la parte baja, fustal más cerrado, incluso bastante, pero también con corros de latizal que precisan clareos.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Masa transformada en estado de latizal bajo que necesita clareos. Sobresalen de vez en cuando algunos árboles padre pero sólo ocasionalmente. Los bosquetes cortados a hecho hace mucho tiempo son actualmente un vallicar entre el que sobresalen algunos pimpollos y algunas matas de pino de poco más de medio metro de altura. La regeneración se está consiguiendo en los cercados.
Regeneración	Masa transformada: no existe.
Problemas fitosanitarios	No se aprecian
Tratamientos selvícolas	Necesidad de clareos
Matorral	No hay
Calidad	
Altitud	
Exposición	
Observaciones	Un zorro corriendo entre los cercados.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 249
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: D	<i>Fustal muy abierto, con regeneración por toda su superficie. Necesidad de clareos en algunos corros de la masa transformada.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Latizal denso joven con algunos árboles padre, pocos, entre majadales de aspecto excelente, aún en plena producción (14/11/98). Al igual que el cantón 250 podría ser un cantón destinado a uso silvopastoral.
Regeneración	No hay: masa joven
Problemas fitosanitarios	Hay que prestar atención al ganado por los posibles daños que pudiera cometer de cara a la realización de cortas.
Tratamientos selvícolas	No ha habido. Podrían acometerse claras.
Matorral	Algunas rosas cerca de los majadales.
Calidad	
Altitud	
Exposición	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

División dasocrática	3ª B 250
Anterior Informe selvícola (88-89) Anterior Grupo: C	<i>Completamente regenerado. Hay zonas que son latizales, otras de menor edad; y es muy escasa la masa adulta que queda. Necesidad de clareos y claras.</i>
Clase de edad Forma y distribución de la masa	Latizal alto, a veces fustal bajo (esto por la parte superior, junto al 247). En medio están los corrales de Río Peces y los majadales del cerro de la Cachiporra, muy buenos y aún en producción (14/11/98), densos y completamente tapizados, sin síntomas de erosión, ni de sobrepastoreo. Podría tener vocación silvopastoral.
Regeneración	No hay
Problemas fitosanitarios	Atención al ganado.
Tratamientos selvícolas	No son necesarios por ahora.
Matorral	Presencia de rosa y majuelo.
Calidad	
Altitud	
Exposición	