

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 56
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Masa de fustal viejo, claro, con algún corro de regeneración en la parte colindante con el 61, pero sólo ahí.
<b>Regeneración</b>	Sólo en la colindancia con el cantón 61 hay algunos corros.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Derribos escasos y algunos pies muertos en pie.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Abundante enebro y piorno.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 57
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Muy parecido al 58, aunque con mejor aspecto. Fustal alto, claro, sin regeneración, con algunos derribos por la nevada del 96, más en las caídas al Arroyo de Dos Hermanas.
<b>Regeneración</b>	No hay. En la confluencia de los cantones 56, 57, 60 y 61 hay un corro extenso, pero que debe pertenecer al 61.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos derribos por las nevadas del año 96.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Enebro abundante, algo de piorno.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 58
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto, viejo, abierto y ramoso, aunque no de tan mala calidad como otros de la misma altitud. La mayor parte de la superficie es un canchal.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se advierten, a pesar de la altitud y de las fuertes nevadas del año 96.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Enebro bastante abundante y algo de piorno. Algún cambroño ocasional.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1º P 92
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Cerca del canchal del norte del cantón, la masa es un fustal medio con cierta tendencia a la semirregularidad por presencia de latas. Sin regeneración. Avanzando aparece una masa semirregular formada por un latizal alto y un fustal medio. En la parte inferior del cantón y por enmedio aparece una repoblación, que llega a la parte alta del 111 de unos 20 a 25 años, muy densa, por terrazas. En la parte sur, en las caídas al Arroyo de las Quebradas, la masa es un fustal abierto, con enebro abundante y con pedregosidad elevada, de mala calidad. Es, en conjunto, un cantón irregular.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Bastantes derribos cerca del canchal del norte del cantón. Canchales en los extremos norte y sur del cantón. Bastante pedregosidad.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Mucho piorno y enebro, aún entre el pinar; ahogado en la zona de la repoblación. El enebro es muy abundante en las caídas al Arroyo de las Quebradas.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1º P 93
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal viejo con golpes de regeneración con cierta tendencia a la irregularidad por presencia de algunos corros de latizal.
<b>Regeneración</b>	Sólo corros ocasionales dispersos, de menos de 20 años.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Derribos por la nevada de 1996. Algunas tollas.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Abundante enebro en la zona del canchal y en los claros.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	Un pequeño sapo, cruzando la pista de Majada Hambrienta.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 94
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Masa semirregular con fustal alto/latizal bajo bastante denso, de mala calidad (muy ramoso)
<b>Regeneración</b>	Es un latizal viejo, por lo que no hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	Ocasionales cortas antiguas, por huroneo, pero nada más.
<b>Matorral</b>	Enebro junto al cervunal superior.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	Un buitre negro volando alto.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 95
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Todo el cantón está formado por un fustal alto viejo ramoso sin regeneración. De mala calidad aparente
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos derribos por la nevada de enero de 1996. Algún corro aislado de <i>Ips acuminatus</i> .
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido. Si hubiera ocasión, se debería repasar el cantón por los derribos y los corros de <i>Ips</i> .
<b>Matorral</b>	Enebro en el límite del monte y entre el cervunal de arriba.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 96
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Pinar de mala calidad, abierto en la parte alta. Fustal alto denso, muy ramoso, que conforme se avanza hacia la Majada del Tío Blas va tornándose semirregular y termina siendo un latizal. Desde la mitad del cantón hacia el norte, comienza a haber derribos, por debajo de las peñas que hay fuera del monte. Los derribos son bastante frecuentes en la zona del latizal.
<b>Regeneración</b>	No hay, salvo esporádicos, pequeños y ahogados.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian. Un canchal extenso cerca del nacimiento del Arroyo Carneros
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	En la parte alta, muchísimo cambrón, piorno, enebro, helecho y, en las vaguadas, brezo. Altura del matorral, entre 1,25 y 2 m. Más hacia abajo del cantón, hay algo de enebro y, sobre todo, helecho.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	1.750
<b>Exposición</b>	Oeste
<b>Observaciones</b>	4 buitres negros adultos y 3 jóvenes sobre la Majada del Tío Blas.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 97
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Pinar de mala calidad, abierto en la parte alta, con dos edades, una por encima de los 140 años y otra entre 80 y 100 años. Sin regeneración
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	En la parte alta, muchísimo cambrón, piorno, enebro, helecho y, en las vaguadas, brezo. Altura del matorral, entre 1,25 y 2 m.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	1.750
<b>Exposición</b>	Solana
<b>Observaciones</b>	4 buitres negros adultos y 3 jóvenes sobre la Majada del Tío Blas. El matorral y pinar están hozados fuertemente por los jabalíes.

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 56
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto viejo, más o menos abierto.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Mala calidad del fustal, por la altitud
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	Bastante piorno y enebro
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	Bastantes buitres volando

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 55
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto viejo, más denso que el cantón adyacente 56, con alguna tendencia a la semirregularidad por presencia de algunos corros de latas y latas aisladas bajo los fustes.
<b>Regeneración</b>	Sin regeneración.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos pies gruesos secos en pie. Aspecto de poco suelo.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Algo de piorno y enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	Bastante buitre.

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 54
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto más o menos denso, regular, con algunos ejemplares verdaderamente gruesos pero no muy altos
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos pies gruesos muertos en pie. Elevada pedregosidad y poco suelo.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Piorno y enebro en las zonas algo más abiertas.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 49 y 50
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Son dos cantones prácticamente iguales. Fustal alto puro, menos denso, con arbolado ramoso de mala calidad, sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Elevada pedregosidad, con sendos canchales, aunque el del 50 está tapizado de enebro.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	
<b>Matorral</b>	Sotobosque de enebro, aún bajo el pinar (en donde éste es menos denso) y piorno. Grandes ortigas en el canchal del 50.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 51
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto, grueso, menos denso, muy viejo y de mala calidad, aunque algo mejor, tal vez, que los cantones 52 y 53.
<b>Regeneración</b>	Nada
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian. Menos pedregoso, aunque lo es, que los cantones 52 y 53.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No se aprecian
<b>Matorral</b>	Bastante enebro y piorno, sin cambrón. Helecho en su parte central.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 52
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto denso grueso, sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos pies muy gruesos muertos, tanto en pie como en el suelo. Abundante ganado caballar, con ligeros síntomas de erosión en el borde de los arroyos y presencia allí de nitrófilas. Bastante pedregosidad.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Abundante sotobosque de enebro, piorno y cambrón. Empradizado algo el suelo hacia la parte central, por donde los arroyos centrales.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 53
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto denso, con aspecto de no muy buena calidad, con algunos corros de monte bravo, pero muy poca cosa.
<b>Regeneración</b>	Prácticamente no hay salvo algunos corros aislados.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Elevada pedregosidad y un corro de <i>Ips</i> cerca del límite con el 52. Canchal.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	
<b>Matorral</b>	Enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 48
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Cantón bien metido en protección debido a la elevada pedregosidad y rocosidad del suelo, pese a bajar en altitud bastante y presentar una masa de calidad aceptable. Fustal alto denso sin regeneración, salvo ocasionales bosquetes hacia el Boquete Alto de Majalgrillo, de latizal ahogado por el dosel de copas superior.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Bastantes pies muertos tanto en pie como en el suelo. Algunos respaldares.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No hay
<b>Matorral</b>	Fundamentalmente piorno, acompañado de brezo y menos enebro. Presencia de cambrón.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 7
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto viejo con algunas latas (¿dominados?) en medio. La mitad del cantón, hacia el 6, es un latizal alto denso, seguramente producto de algún antiguo incendio.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Algunos pies secos en pie. Algún respaladar.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Piorno y, sobre todo, enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 6
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	La mitad del cantón hacia el 7 es un latizal; la otra mitad, hacia el 5, es un fustal alto, denso, viejo y muy ramoso.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	Piorno y enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1º P 5
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto viejo de mala calidad en el que conforme se va avanzando hacia el 4 va apareciendo algo de regeneración, por la parte baja.
<b>Regeneración</b>	Parte baja, hacia el 4: presencia de algunos corros de monte bravo.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 4
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto viejo grueso y más claro que lo visto hasta ahora por esta zona de protección, de mala calidad, sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Pedregosidad importante. Algunos pies secos en pie. Hay un canchal en medio (enfrente del Apeadero de Vaquerizas, hacia Navacerrada)
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Enebro abundante.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 3
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto menos grueso y más denso que el 4.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Pedregoso, pero menos que el 4.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Enebro, pero en menor cantidad que en el cantón 4.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 2
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Muy poca masa y de mala calidad, más abierto que lo visto hasta ahora en esta parte de protección.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Un par de canchales
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	Bastante enebro y piorno tapizando el suelo.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 1
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Faja muy estrecha de pinar de mala calidad, grueso, ramoso en el que parece que hay dos clases de edad: una muy vieja y otra de latizales altos/fustales bajos, de unos 100 a 120 años de edad, mucho más bajos.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	Abundante sotobosque de piorno y enebro
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 160
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	<i>No se realizó</i>
<b>Clase de edad</b>	Muy parecido al cantón 159, aunque con algo de regeneración, aunque muy escasa.
<b>Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto no excesivamente denso, prácticamente sin regeneración excepto algún corro de repoblado aislado y pequeño.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian, salvo algunos derribos cerca del arroyo límite con el 171. Muy rocoso, como el cantón 170.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Algo de enebro y piorno; en general, limpio.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. N° 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 171
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	<i>No se realizó</i>
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto y viejo, denso y sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Muchos derribos en el suelo. Muy rocoso.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Algo de enebro.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 172
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	<i>No se realizó</i>
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto y viejo, denso y sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Muy rocoso. Frecuentes derribos, aunque menos abundantes que en el cantón 171.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido, ni siquiera limpiezas de los derribos.
<b>Matorral</b>	Prácticamente inexistente; solo algo de enebro de forma esporádica y de arándano.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª P 179
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto, grueso y de mala calidad, más denso hacia Collado Ventoso que hacia el Puerto de la Fuenfría.
<b>Regeneración</b>	No hay.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Muy pedregoso. No se observan otros daños.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Sotobosque frecuente de enebro y piorno hacia Collado Ventoso; presencia de arándano especialmente junto a las pedrizas del cantón.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 187
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto y claro mezclado con algunos pimpollos dispersos que le confieren un cierto carácter de semirregular, aunque esta regeneración no está demasiado extendida.
<b>Regeneración</b>	Pimpollos dispersos.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Bastante pedregoso. Abundantes derribos en los pimpollos por la nevada de 1996. Masa bastante afectada por <i>D. pini.</i> , especialmente en los pimpollos; algunos enebros afectados también como si tuvieran <i>D. pini.</i>
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	Bastante enebro y piorno. Presencia de cambrón.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 193
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto medianamente denso y prácticamente sin regeneración, salvo algunos pimpollos sueltos y pequeños.
<b>Regeneración</b>	Prácticamente nada de regeneración, solo algunos pequeños pimpollos sueltos.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Bastante pedregosidad. Muy afectado por <i>D. pini</i> , tanto en los fustes como en los pimpollos, aunque estos últimos están completamente defoliados. Desde la Fuenfría se aprecian muy bien estos daños, al igual que las pedrizas. Derribos de gruesos dispersos que solo se han limpiado cerca de la Majada Minguete. Abundante ganado, especialmente caballo, si bien está también presente el vacuno.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	
<b>Matorral</b>	Cambrón y enebro extendidos, con presencia de piorno y helecho localmente.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª P 192
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal alto y de mala calidad con algunas latas y pimpollos doispersos, aunque sin regeneración.
<b>Regeneración</b>	Algunos pimpollos dispersos.
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Pedregosidad. Muy afectado por <i>Diprion pini</i> , tanto en fustes gruesos como en pimpollos, que están completamente defoliados. Algunos derribos. Bastante ganado caballar.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	
<b>Matorral</b>	Piorno y enebro con presencia de cambrón.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

<b>División dasocrática</b>	1ª R 89
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal medio, sin regeneración, limpio.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian, salvo algo de muérdago.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	No hay.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª R 90
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Fustal medio, sin regeneración, limpio.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	No se aprecian, salvo algo de muérdago.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido
<b>Matorral</b>	No hay.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	

**INFORME SELVÍCOLA DEL M.U.P. "PINAR" DE VALSAÍN. Nº 2 C.U.P.(SEGOVIA).  
CENTRO MONTES DE VALSAÍN. D.G.CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA**

<b>División dasocrática</b>	1ª R 88
<b>Anterior Informe selvícola (88-89)</b>	No se realizó
<b>Clase de edad Forma y distribución de la masa</b>	Masa semirregular de fustal alto con latizal bajo, por bosquetes, con algún corro de regeneración y zonas abiertas, bastante pisoteadas.
<b>Regeneración</b>	No hay
<b>Problemas fitosanitarios</b>	Presencia de muérdago. Zonas muy compactadas por pisoteo. Presencia de basura, junto al Eresma.
<b>Tratamientos selvícolas</b>	No ha habido.
<b>Matorral</b>	No hay.
<b>Calidad</b>	
<b>Altitud</b>	
<b>Exposición</b>	
<b>Observaciones</b>	