


## ANEXO I

### *Edades de pollos de buitre negro*




Foto: Alfonso San Miguel.

Clasificación de la edad de los pollos de buitre negro. Extraído de Bernis, F. 1966. El Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en Iberia. *Ardeola*, 12: 51-78.



Ilustraciones del desarrollo corporal de pollos de buitre negro en el nido.



Detalle del desarrollo de la cabeza de pollos de buitre negro en nido.

**Fase 1ª.** 0-18 días de edad. El pollo presenta plumón natal de color blanco-beige no sucio en el tronco y extremidades. Peso aproximado de 110 g al nacer.

**Fase 2ª.** 19-40 días de edad. El pollo tiene un segundo plumón, con un tamaño aproximado desde entre 25 y 40 cm de longitud, de color pardo en el tronco y blanco sucio en el capirote.

**Fase 3ª** (sin dibujo). 36-50 días de edad. Entremezcla de segundo plumón y plumas teleóptilas. Las rémiges primarias oscilan entre 4 y 10 cm de longitud. Longitud corporal entre 35 y 50 cm.

**Fase 4ª.** 51-70 días de edad. Tamaño de medio buitre, con el tronco totalmente cubierto de plumas, que continúan creciendo. Muy poco plumón en el cuerpo. Las rémiges primarias miden de 14 a 20 cm.

**Fase 5ª.** 71 días hasta la edad de vuelo. Pollo subigualón o casi volandero. Las plumas alcanzan su completo desarrollo. Se produce un oscurecimiento general del pfele y cara, en sintonía con el color oscuro del plumaje.