


Nombre común  
Nombre científico

Sapillo moteado común  
*Pelodytes punctatus*



[CAB, TAB]



Eularico Fernández Valero



Fuentes: SIARE OAPN (2015)



## Sapillo moteado común

Tamaño medio de 4 cm. **Cabeza** aplanada y hocico alargado, con **ojos** saltones relativamente grandes y pupila vertical. **Piel** lustrosa y resbaladiza de color variable, aunque suele mostrar un moteado verde más o menos patente en dorso, cabeza y extremidades. Vientre claro, con un moteado oscuro. **Extremidades** largas, particularmente las posteriores, con cinco dedos donde el **cuarto** es muy largo.

Puede ocupar **hábitats** forestales, como son encinares, hayedos o pinares. Es una especie **trepadora**, ocupando a menudo la parte exterior de cuevas. Es muy flexible en el uso de los hábitats acuáticos tolerando un elevado índice de salinidad. Habitualmente utiliza **charcas temporales** para la reproducción aunque puede también ocupar balsas permanentes e incluso cunetas, campos de labor, fuentes o abrevaderos.

Pueden tener dos períodos de **reproducción**, uno a mediados del otoño y otro a finales de invierno y primavera, asociados con las precipitaciones estacionales. Los **huevos** son negros y pequeños dispuestos en cordones de 7-8 cm., que contienen de 40 a 700 huevos, que se depositan sobre la vegetación, tanto en zonas profundas como cercanas a la orilla. **Larvas** de mediano tamaño con un desarrollo bastante rápido, pudiendo alcanzar la metamorfosis en dos meses.

Tiene **hábitos** terrestres y nocturnos. Bastante **ágil**, se mueve a saltos. Se **alimenta** preferentemente de insectos que detecta visualmente y a los que persigue de forma activa. El período de reposo invernal se realiza en tierra, a veces en cuevas. Las aves nocturnas además del jabalí, son los principales depredadores de esta especie.