



Nombre común
Nombre científico
[DON, SNE]

Sapillo moteado ibérico
Pelodytes ibericus



Sapillo moteado ibérico



GUÍA DE ANFIBIOS
de los Parques Nacionales Españoles



De **tamaño** medio no sobrepasa los 4 cm. **Cabeza** aplastada, tan larga como ancha y **hocico** corto y redondeado. **Ojos** grandes y prominentes, con la **pupila** de color negro, vertical. El **dorso** presenta un color de fondo que puede variar individualmente, mostrando desde tonos pardo amarillentos, a verdosos. Su **piel** está llena de pequeñas protuberancias redondeadas de colores variados como el marrón o el verde-oliva-ceo. El vientre es liso y de color crema claro.

Se puede encontrar en gran variedad de **substratos**. En general muestra preferencia por zonas abiertas y despejadas de vegetación. No suelen estar en aguas muy eutrofizadas pero sí resisten moderados niveles de salinidad. Puede utilizar **medios muy estacionales**, como son pequeñas charcas y encharcamientos de pocos cm (unos 20 cm) de profundidad, hasta grandes lagunas.

Realizan sus **puestas** en pequeñas charcas y balsas artificiales o pequeños remansos de arroyos. Suelen poner **huevos** de color pardo, enredados por un fino cordón de gelatina que los une en grupitos de entre 200 hasta 900, entre ramas sumergidas a escasa profundidad. El **periodo larvario** suele durar entre dos y tres meses y depende de la temperatura y la duración de las charcas.

Generalmente son de hábitos **crepusculares** y **nocturnos**. La secreción de sustancias tóxicas y el vaciado de la vejiga, así como sus largas patas, que le permiten escapar de sus enemigos con agilidad saltando al agua, son **estrategias** frente a sus predadores. En la fase terrestre, se alimenta de pequeños invertebrados.