


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 17 de febrero de 2021


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias y la Península para el día 17 de febrero. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 100-1280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sobre todo el archipiélago canario. No coinciden en sus estimaciones de las concentraciones para la Península que podrían estar en los rangos 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sobre zonas del centro y este, 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sobre el sur y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sobre el noreste. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre las islas Canarias y zonas del sur, centro, este norte y noreste de la Península y húmedo sobre el noroeste peninsular a lo largo del día.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 17 de febrero. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste y norte de la Península, 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y sureste, 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y centro y 160-1280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB-MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 17 de febrero. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 80-1280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, 10-320 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste de la Península, 10-160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para zonas del centro, 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y este y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste peninsular.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB-MONARCH para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias y la Península para el día 17 de febrero. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $100\text{-}1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, $1\text{-}500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para zonas del centro peninsular, $1\text{-}100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la zona de levante, $1\text{-}50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste y $1\text{-}25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste peninsular.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias y el sur de la Península para el día 17 de febrero. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $80\text{-}2580 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias y $20\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste peninsular.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén también la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias y la Península para el día 17 de febrero. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 50-2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y centro de la Península y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, este, norte y noreste peninsular.





Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano sobre las islas Canarias y la Península durante el día 17 de febrero.





Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.





Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 17 de febrero de 2021 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre las islas Canarias y zonas del sur, centro, este norte y noreste de la Península y húmedo sobre el noroeste peninsular a lo largo del día 17 de febrero.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 17 de febrero de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 16 de febrero de 2021.

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.